

Thông tin Dành cho Bệnh nhân



Tôi vẫn còn bị dị ứng thuốc kháng sinh hay không?

Tài liệu này không thay thế lời khuyên của chuyên gia chăm sóc sức khỏe có liên quan của quý vị.

Nhiều người cho biết họ bị dị ứng với thuốc kháng sinh, đặc biệt là với penicillin. Nhiều trường hợp dị ứng thuốc kháng sinh biến mất sau một vài năm. Quý vị có thể làm xét nghiệm để biết quý vị có còn bị dị ứng thuốc kháng sinh hay không. Kết quả xét nghiệm sẽ giúp quý vị được dùng loại thuốc kháng sinh tốt nhất và an toàn nhất để giúp quý vị bình phục nhanh hơn sau khi bị nhiễm trùng, hiện tại hoặc trong tương lai.

Dị ứng thuốc kháng sinh là gì?

Dị ứng thuốc kháng sinh xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng với loại thuốc kháng sinh không phù hợp với cơ thể. Khi điều này xảy ra, hệ thống miễn dịch tạo ra các triệu chứng dị ứng. Dị ứng thuốc kháng sinh có thể trầm trọng (nguy hiểm đến tính mạng) hoặc nhẹ.

Dị ứng trầm trọng (nguy hiểm đến tính mạng) đối với thuốc kháng sinh bao gồm:

- sốc phản vệ (phản ứng dị ứng đối với các chất như thuốc men, thực phẩm hoặc côn trùng cắn). Các triệu chứng hoặc dấu hiệu sốc phản vệ bao gồm:
 - huyết áp rất thấp
 - mạch hoặc nhịp tim yếu và/hoặc nhanh
 - phát ban kèm các triệu chứng khác, phát triển nhanh chóng sau khi tiếp xúc với chất đó
 - sưng môi hoặc lưỡi

Nếu có bất kỳ dấu hiệu hoặc bị bất kỳ triệu chứng sốc phản vệ nào, quý vị nên lập tức gọi 000 để được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

- phát ban, kèm theo trở nên rất không khỏe

Quý vị có thể bị dị ứng thuốc kháng sinh nhẹ nếu quý vị có:

- bị phát ban trong thời gian hoặc ngay sau khi kết thúc đợt điều trị thuốc kháng sinh bác sĩ kê toa khi còn nhỏ hoặc cách đây đã lâu
- phát ban trên các phần nhỏ trên cơ thể quý vị trong thời gian hoặc ngay sau khi dùng thuốc kháng sinh
- đã bị phản ứng không giải thích được với loại thuốc kháng sinh hơn 10 năm trước.

Nhiều phản ứng dị ứng thuốc kháng sinh biến mất theo thời gian hoặc có thể không phải do thuốc kháng sinh gây ra. Nếu nghĩ rằng mình bị dị ứng với thuốc kháng sinh, quý vị có thể cần phải làm xét nghiệm để biết chắc chắn.

Thông tin Dành cho Bệnh nhân

Tựa đề tài liệu: Tôi vẫn còn bị dị ứng thuốc kháng sinh hay không?

Xét nghiệm dị ứng có phù hợp với tôi không?

Bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem phản ứng của quý vị là trầm trọng (nguy hiểm đến tính mạng) hay nhẹ. Quý vị sẽ cần trả các câu hỏi và điều quan trọng là quý vị cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Bác sĩ chuyên khoa sẽ đề nghị liệu xét nghiệm dị ứng thuốc kháng sinh có phù hợp với quý vị hay không và (những) xét nghiệm nào là tốt nhất cho quý vị dựa trên thông tin quý vị cung cấp. Quý vị nên đặt câu hỏi để giúp quý vị quyết định xem quý vị có muốn thực hiện (các) xét nghiệm đã được đề xuất hay không.

Tôi có thể làm những xét nghiệm nào để biết tôi có còn bị dị ứng thuốc kháng sinh hay không?

Hiện nay chúng ta sử dụng hai loại xét nghiệm chính. Đó là:

- xét nghiệm da
- xét nghiệm thử bằng đường miệng

Tùy thuộc những gì bác sĩ đã thăm đi nh, quý vị có thể hoặc không thể xét nghiệm da trước khi tiến hành xét nghiệm thử bằng đường miệng.

Xét nghiệm da là gì?

Trong lúc làm xét nghiệm da, bác sĩ hoặc y tá sẽ tiêm một ít các loại thuốc kháng sinh khác nhau ngay dưới da. Xét nghiệm kiểm soát dương tính histamine được sử dụng để kiểm tra xem da quý vị có phản ứng bình thường không. Xét nghiệm này rất an toàn và hầu hết mọi người đều dung nạp tốt. Xét nghiệm da mất khoảng bốn giờ mới xong.

Nếu bị dị ứng với bất kỳ loại thuốc kháng sinh nào đã sử dụng, quý vị sẽ bị phản ứng nhẹ trên da trông giống như vết muỗi đốt. Điều này thường xuất hiện trong vòng năm đến mười phút và mất dần sau sáu mươi phút.

Phản ứng nhẹ có thể xuất hiện vài ngày sau khi xét nghiệm, nhưng trường hợp này rất hiếm. Chúng tôi sẽ trao cho quý vị bức thư để quý vị mang về nhà cùng với số điện thoại để gọi nếu quý vị nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường mà quý vị nghĩ có thể liên quan đến xét nghiệm.

Nếu quý vị không có bất kỳ phản ứng nào, sau xét nghiệm này, quý vị thường sẽ làm xét nghiệm thử bằng đường miệng - xem ở bên dưới.

Xét nghiệm thử bằng đường miệng là gì?

Đối với xét nghiệm này, quý vị sẽ nuốt một ít thuốc kháng sinh. Y tá sẽ theo dõi quý vị kỹ trong hai giờ để xem quý vị có bị bất kỳ phản ứng nào không. Quý vị sẽ mất khoảng hai giờ để làm xét nghiệm thử bằng đường miệng và nhận kết quả.

Thông tin Dành cho Bệnh nhân

Tựa đề tài liệu: Tôi vẫn còn bị dị ứng thuốc kháng sinh hay không?

Phát ban nhẹ có thể xuất hiện vài ngày sau khi xét nghiệm, nhưng trường hợp này rất hiếm. Chúng tôi sẽ trao cho quý vị bức thư để quý vị mang về nhà cùng với số điện thoại để gọi nếu quý vị nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường mà quý vị nghĩ có thể liên quan đến xét nghiệm.

Các lợi ích của việc làm xét nghiệm dị ứng

- Quý vị sẽ biết mình có bị dị ứng thuốc kháng sinh hay không bằng cách làm (các) xét nghiệm do bác sĩ chuyên khoa đề nghị.
- Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy quý vị không còn bị dị ứng thuốc kháng sinh nữa, thì có nhiều khả năng quý vị sẽ được dùng loại thuốc kháng sinh tốt nhất và an toàn nhất để điều trị khi bị nhiễm trùng. Đối với quý vị, điều này có thể có nghĩa là bình phục nhanh hơn.

Các xét nghiệm dị ứng có an toàn không?

- Có, các xét nghiệm đều an toàn.
- Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã làm các xét nghiệm này. Sau khi xét nghiệm, hầu hết mọi người đều phát hiện ra rằng họ có thể dùng thuốc kháng sinh mà họ cho rằng mình bị dị ứng, một cách an toàn.
- Khoảng 80% (tám trong số mười) người làm xét nghiệm dị ứng thuốc kháng sinh phát hiện ra rằng họ không còn bị dị ứng thuốc kháng sinh nữa.
- Trong lúc làm (các) xét nghiệm, bác sĩ chuyên khoa hoặc y tá sẽ theo dõi quý vị kỹ. Nếu quý vị bị phản ứng dị ứng, xét nghiệm sẽ dừng lại và quý vị sẽ được điều trị ngay lập tức. Các bác sĩ và y tá của chúng tôi là những chuyên gia về điều trị các phản ứng dị ứng.
- Quý vị sẽ chỉ được làm xét nghiệm nếu bác sĩ chuyên khoa cho rằng nguy cơ quý vị vẫn bị dị ứng thuốc kháng sinh là thấp.

Điều gì xảy ra sau khi quý vị đã làm (các) xét nghiệm?

Quý vị và bác sĩ sẽ nhận được thông báo về kết quả xét nghiệm.

Quý vị sẽ nhận được bức thư giải thích:

- tên xét nghiệm và kết quả của quý vị
- tên các loại thuốc kháng sinh an toàn nhất cho quý vị.

Chúng tôi sẽ xóa dị ứng thuốc kháng sinh trong bệnh sử của quý vị nếu (các) xét nghiệm cho thấy quý vị không bị dị ứng thuốc kháng sinh.

Thông tin Dành cho Bệnh nhân

Tựa đề tài liệu: Tôi vẫn còn bị dị ứng thuốc kháng sinh hay không?



Muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

<https://antibioticallergy.org.au/>

Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 000 để xin xe cứu thương hoặc đến khoa cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

Ngày thực hiện: Tháng 3 năm 2023