

Cloranfenicol Vitaminado

Jarabe antibiótico Vitaminado



Caninos
Uso en Medicina Veterinaria
Venta bajo receta

Fórmula:

Cada 100 ml. contiene: Cloranfenicol Palmitato:5,500 g., Vitamina B1:0,120 g., Vitamina B6:0,025 g., Vitamina B12:0,150 mcg., Vitamina C:0,400 g., Nicotinamida 0,060 g., Acido Paraamino benzóico (Vit. H):0,120 g., Pantotenato de calcio: 0,050 g., Ácido fólico (Vit. M):0,050 g., Excipiente saborizado c.s.

Acción:

Cloranfenicol Vitaminado, es una asociación de un antibiótico bacteriostático de amplio espectro y ocho vitaminas. Formulado como jarabe, no solo actúa contra una amplia gama de agentes bacterianos grampositivos y gramnegativos y en infecciones mixtas o complicadas con gérmenes resistentes a otros antibióticos, sino también como refuerzo a la medicación para estimular el apetito, mejorar la anemia, restablecer más rápidamente a los animales enfermos.

Como antibiótico, el cloranfenicol se absorbe con facilidad cuando se lo suministra por vía oral generando niveles séricos muy satisfactorios para el control de las infecciones sistémicas

o localizadas. No tiene acción irritante sobre la mucosa intestinal.

Debe destacarse su excelente actividad, complementada por las vitaminas, en las infecciones del aparato gastrointestinal, también en los procesos respiratorios, del aparato genitourinario, del sistema músculo esquelético y aún, del sistema nervioso, todo ello a favor de su notable difusibilidad a través de las membranas meníngeas, serosas, y fetales.

Espectro Antibacteriano:

Colibacilos, salmonelas, pasteurelas, estafilococos, estreptococos, haemophilus, pseudomonas, shigellas, klebsiellas, vibrios, rickettsias, clamidias, corynebacterium spp, neisserias, actinomyces y activo contra cepas sensibles de leptospiras spp. y algunos microplasma.

Administración y dosificación:

El Cloranfenicol debe ser administrado a razón de 50/100 mg/kg. Por lo tanto deberá administrar de 1 a 2 medidas de 5ml. cada 5kg. de peso vivo (1 medida dosificadora 5ml.)

Perros de talla chica y gatos: 1 medida cada 6hs.

Perros de talla media: 2 medidas cada 6hs.

Perros de talla grande: 2 a 3 medidas cada 6hs.

Perros el tratamiento debe continuarse hasta 48hs. luego de la desaparición de los síntomas. Gatos no prolongar el tratamiento más de una semana.

Conservación:

Entre 5° y 25°C

Producto Inscripto en SENASA

Certificado N°87.232

Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF,

Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (011) 5430-5578 / +54 (011) 5431-5782

INDUSTRIA ARGENTINA