

Prednisolona

Antiinflamatorio Esteroide Comprimidos



Caninos y Felinos

Venta bajo receta

Uso en Medicina Veterinaria

Fórmula:

Cada comprimido contiene Prednisolona 10mg., excipientes csp.

Presentación:

Caja de 10 Blíster x 10 Comp.

Acción:

PREDNISOLONA ELMER es un corticoesteroide sintético de acción intermedia por su efectividad en muchos procesos antiinflamatorios, alérgicos, autoinmunes y, aún en cierto tipo de neoplasias.

Su presentación en comprimidos permite el uso por vía oral, que es de elección en un plan de suministro en días alternados, ajustándose al ritmo circulatorio (o **Circadiano**) normal de cada especie sin inhibición del eje hipotálamo hipofisario.

Indicaciones:

PREDNISOLONA ELMER está indicada para la terapia de reemplazo, como tratamiento de procesos inflamatorios y alergias al suprimir los mecanismos inmunológicos. Controla las enfermedades autoinmunes, como el complejo pénfigo, integrado por el pénfigo vulgar y su variante pénfigo vegetante, así como el pénfigo foliáceo, la forma más común en el perro y en el gato y su forma benigna el pénfigo eritematoso.

Dosificación:

Terapia de reemplazo: 2,5 mg (0,25 mg por kg de peso). En casos de estrés como cirugías, viajes u otras causas es conveniente aumentar la dosificación al doble.

Antiinflamatorio: 5 a 10 (0,5 mg a 1 mg por kg de peso), que corresponde de medio a un comprimido cada 10 kg de peso.

Antialérgico: como dosis de ataque 5 a 10 mg (0,5 a 1 mg por kg de peso) durante 7 días, que corresponde de medio a un comprimido cada 10 kg de peso.

A partir de la segunda semana pasará a administrar igual dosificación pero día por medio (cada 48 hs.).

En la tercera semana se continúa el tratamiento cada 48 hs pero la dosis se reduce a la mitad para cada toma, es decir, si el paciente de 10 kg reciba un comprimido día por medio, se pasa a medio comprimido cada 48 horas.

Por último, se continúa reduciendo a la mitad de la dosis semanalmente, siempre con 48 horas de intervalo entre cada toma, hasta llegar a una dosis mínima en la que los síntomas reaparecen. Cuando esto ocurre, se regresa al régimen de la semana anterior, donde la sintomatología se encontraba bajo control y se mantiene dicho esquema.

Inmunosupresión: 20 a 40 mg (2 a 4 mg por kilo).

Se aconseja administrar los comprimidos, en el perro, entre las 7 y 10 horas de la mañana y en el gato, entre las 22 y 24 horas para coincidir con la curva hormonal normal y los picos de máxima secreción suprarrenal, evitando de este modo la retroalimentación negativa.



Precauciones:

No sobre dosificar. Una sobre dosificación puede provocar hipofunción adrenal y Síndrome de Cushing.

Contraindicaciones:

Sarna demodética, artritis crónica, insuficiencia hepática y renal, úlcera duodenal, enfermedades micóticas, glaucoma.

Conservación:

Entre 5° y 25° C

Mantener fuera del alcance de los niños

Centro nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160

Producto inscripto en SENASA

Certificado N° 87519

Cnel. Uzal 3376, Olivos, B1636DGF,

Buenos Aires, Argentina

Tel. +54 (011) 5430-5578 / +54 (011) 5431-5782

INDUSTRIA ARGENTINA



Elmer Argentina

Agreed Laboratorios S.A.- Dirección: Coronel Uzal 3376 (B1636),
Olivos, Buenos Aires, Argentina



Contáctenos:

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8 a 17 Hs-
Teléfonos: +54 11 5430-5578 o +54 11 5431-5782