

MANTENO 42 SC

Fungicida

Ditiocarbamato-Mancozeb



DIVISIÓN AGROSUPERIOR S.A.

Modo de acción

Manteno 42 SC es un fungicida ditiocarbamato a base de Mancozeb con acción protectante. Bloquea grupo SH de enzimas y compuestos involucrados con la respiración del hongo.

Características

Tiene acción multisitio, no genera resistencia. Combate *Phytophthora*, botritis, mildiús polvosos, antracnosis, *Septoria* y *Alternaria* y sigatoka negra.

DL 50: 4500 mg/kg

Enfermedades a controlar

Phytophthora spp, *Alternaria solani*, *Colletotrichum* spp, *Pyricularia oryzae*, *Helminthosporium oryzae*, *Coryneum* sp, *Taphrina* sp y *Mycosphaerella fijiensis*.

Compatibilidad

Es compatible con los plaguicidas como diazinón, cartap, azufre. Tómese precauciones con productos cúpricos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (P/P)

Complejo de manganeso con sal de Zinc	42,0%
Inertes	48,0%
Total	100,0 %

Cultivos y dosis

Banano: 3.0 - 4.0 L/ha.

Cebolla: 1.6 L en 200 L de agua/ha.

Melón: 1.5 L/ha.

Papa 1.5 - 2.75 L/ha. en 200 L de agua/ha.

Pepino 1.75 L en 200 litros de agua/ha.

Tomate 1.2 - 2.75 L en 200 L de agua/ha.

Intervalo de aplicación

Tomate, melón, pepino, cebolla y papa: 7 días. Banano: 7 - 10 días.

Interv. entre última aplicación y la cosecha

Tomate, melón; 7 días. Cebolla, pepino, papa: 15 días. Banano: Sin restricción.

Fitotoxicidad

No es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas.