

# Comorbilidad y diagnóstico diferencial en Autismo

CONTENIDO INDeB



# La complejidad del diagnóstico en autismo se puede deber a:


- Se trabaja con una persona en crecimiento, sujeto a influencias genéticas y ambientales, que cambia constantemente.
- La evaluación puede ser no determinante si no se considera el desarrollo. Los síntomas pueden variar a través de la vida y ser menos manifiestos a medida que esta avanza.
- Se requiere de una evaluación integral y a través de diferentes perspectivas profesionales.
  - Se necesita de tiempo para la observación el diálogo tanto con el paciente como con sus familiares o cercanos.
- La existencia de amplia comorbilidad complejiza el diagnóstico más aún. Así, hay que tener presente también los diferentes diagnósticos diferenciales según la evaluación clínica.

# Comorbilidad

- El término fue acuñado por Alvar R. Feinstein en la década de los 70's.
- Se habla de comorbilidad cuando hay dos o más diagnósticos intercurrentes, sin que uno sea necesariamente causa del otro. Pueden coexistir en el tiempo.
- Así el déficit de atención o un trastorno de ansiedad puede estar presente (con frecuencia) en una persona en el espectro del autismo.
- Aunque no pueda establecerse relación de causalidad, el impacto de cada diagnóstico impacta al otro o los otros diagnósticos comórbidos de forma que puede amplificar los síntomas o necesidades.




# Comorbilidades en el Autismo 1



- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (28- 44%)
- Síntomas ansiosos (42-56%)
- Depresión (12-70%)
- Trastornos del sueño (50-80%)
- T. Tic (14- 38%)
- T. Obsesivo Compulsivo (7-24%)
- Trastornos psicóticos (12-17%)\*

- Reporte de “conductas agresivas” ( $\leq 68\%$ )
- Conductas autoagresivas ( $\leq 50\%$ )
- Ideación e intentos suicida (11- 14%)

# Comorbilidades en el Autismo 2



- Epilepsia (8 – 30%)
- Trastorno del Lenguaje (~40%)
- Discapacidad Intelectual (~50%)
- Dificultades específicas del aprendizaje (?)
- Dispraxia (?)

## Diagnóstico diferencial

- La evaluación del diagnóstico diferencial es un proceso por el cual se somete a evaluación 2 posibles diagnósticos que expliquen la sintomatología.
- En este proceso por error se puede retrasar el diagnóstico y por lo tanto la terapéutica.



# Diagnósticos a considerar en evaluación diferencial o comorbilidad con Autismo

- La evaluación integral tendrá que considerar la sintomatología actual y el desarrollo. A veces no serán excluyentes los diagnósticos.
- Regresiones secundarias a encefalopatías epilépticas
- Mutismo selectivo y trastornos de ansiedad
- TDAH + T. integración sensorial.
- T. Pragmático de la comunicación
- Déficit intelectual.
- Esquizofrenia

## **Un diagnóstico adecuado requiere de una suma de factores**

**Especialización del profesional/ equipo  
evaluación clínica**

**+ apoyo de evaluación estandarizada**

**+ evaluación multi profesional**

**= mayor precisión diagnóstica**

**(mejora en apoyos terapéuticos y pronóstico)**



# INDeB

Instituto Neurodesarrollo y Bienestar

[www.indeb.cl/blog](http://www.indeb.cl/blog)

DALE LIKE

COMENTA

COMPARTE

GUARDA