

# Identificación temprana del autismo

CONTENIDO INDeB



**INDeB**

Instituto Neurodesarrollo y Bienestar

La identificación temprana de síntomas en los niñ@s con autismo es importante para prestar apoyo a las familias y facilitar el acceso a una educación y un tratamiento adecuado.

# DetECCIÓN TEMPRANA

Los avances sobre la concienciación del autismo no han ido acompañados de una mejora en su edad de diagnóstico.

Los padres se preocupan por el desarrollo de su hijo o hija a los 18-24 meses de edad, pero un meta-análisis de 42 estudios mostró que la edad media de diagnóstico en países desarrollados oscilaba entre los 38 meses y los 120 meses de edad.







**INDeB**

Instituto Neurodesarrollo y Bienestar

# Banderas rojas para alerta de autismo



# Signos de alerta

- No responde a su nombre a los 12 meses de edad.
- No muestra objetos interesantes a los 14 meses de edad.
- No juega a “fingir” o “pretender” en el juego a los 18 meses de edad (ejemplo simular alimentar una muñeca)
- Bajo contacto ocular.
- Tiene dificultad para hablar de sus sentimientos o entender los de otras personas.
- Retraso en la adquisición del habla y otras competencias lingüísticas.



# Signos de alerta

- Da respuestas no relacionadas con las preguntas
- Se altera ante cambios menores del ambiente o rutina
- Tiene intereses obsesivos
- Aletea las manos, da vuelta en círculos o mueve el cuerpo
- Tiene reacciones inusuales a la manera en que las cosas suenan, huelen, saben, se ven o se sienten
- Repite palabras o frases una y otra vez (ecolalias)

# Instrumentos de detección temprana

- Tienen por objeto apoyar una pesquisa o screening de una manera objetiva y medir factor de riesgo. No están diseñados para otorgar o confirmar un diagnóstico.
- Se dispone de varios instrumentos de detección de los cuales muchos son breves, necesitando entre 5 y 10 minutos para completarse y la mayoría son baratos o gratuitos. Existen instrumentos para diferentes rangos de edad.
- En caso de presentar puntaje de corte de factor de riesgo de autismo, se debe iniciar proceso de evaluación diagnóstica con neurólogo o psiquiatra infantil y apoyo de otros profesionales según corresponda (fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional entre otros).



**INDeB**

Instituto Neurodesarrollo y Bienestar

# Algunos instrumentos de screening en autismo

Lista modificada de control para el autismo en niños pequeños (MCHAT R/F)

---

Escala de comunicación y comportamiento simbólico (CSBS – DP)

---

Cuestionario de comunicación social (SCQ)

---

Childhood autism screening test (CAST)

---

Autism spectrum screening questionnaire (ASSQ)

## Bibliografía

Fuentes, J., Hervás, A., Howlin, P. et al. ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based recommendations for diagnosis and treatment. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 30, 961–984 (2021).  
<https://doi.org/10.1007/s00787-020-01587-4>



**INDeB**

Instituto Neurodesarrollo y Bienestar

[www.indeb.cl/blog](http://www.indeb.cl/blog)

DALE LIKE

COMENTA

COMPARTE

GUARDA