

<u>EVALUACIÓN DEGLUCIÓN LACTANTES- CLÍNICA LACTANCIA</u> (EU María Luisa Guzmán, Flga. Macarena Krefft)							
Nombre Niño		Nombre madre/padre					
Rut		Nro Ficha					
Teléfonos							
Niño	Fecha ingreso		Fecha nacimiento				
	Edad		Hospitalización NN (causa, tiempo)				
	Peso nacimiento						
	EG/Adecuación						
	Tiempo transcurrido hasta que lo puso al pecho						
	Fórmula en hospital?						
	Vía de alimentación?						
	Morbilidades asociadas						
	CC		Otras:				
	Pr Resp						
Hiperbili							
Reflujo (describir)							
Madre	Sintomatología depresiva		Cantidad de leche (apreciación materna)	TEST EDIMBURGO (6-8 sem PP)			
	no		poco	Tiempo post parto			
	parcialmente		regular	Puntaje			
	evidente		mucha	Conclusión			
	Antec. previo						
	Redes de apoyo (según apreciación materna) la describe como:			adecuada	escasa	ninguna	
	Descripción del profesional:						
Experiencia previa de lactancia (SI/NO - Tiempo)							
Actitud frente a la lactancia		Expectativa (exclusiva, mixta, fórmula)					
<u>Evaluación de lactancia</u>							
			Fecha evaluación:				
Frecuencia con que toma pecho?							
Tiempo que mama por lado?							
Mama de noche?							
Alterna pecho?							
Se despierta o llora para mamar?							
Se extrae leche?							
Cuánto por vez / en el día							
Cómo							
Cuándo (antes o después de dar de mamar)							
Toma leche materna por mamadera?: Cantidad y Nro veces							

Usa fórmula?. Cantidad, Nro veces y Cuál									
Nro pañales totales/con deposición al día									
Recibió algún tipo de educación de lactancia?. Dónde									
Realiza masajes orofaciales?. Ctas veces al día									
Cuando (antes/despues de mamar)									
Quién(es) lo hacen									
Usa pezonera?				si no		Pecho D°	Pecho I°	Ambos	
Ex. Físico Madre	Nutrición			Mamas		Pezón		Derecho	Izquierdo
	Obesidad			Sanas		formado			
	Sobrepeso			Eritema		plano			
	Eutrófica			Induración		umbilicado			
	Enflaquecida			Sensibilidad/dolor		grietas			
	Desnutrida					micosis			
Libera pecho						Forma tomar el pecho			
si (sosten suelto, arriba o abajo sin deformar pecho)						pinza			
no (se deforma pecho x presión de sosten o ropa)						En C			
						otro (describa)			
Masaje previo pecho				Como ofrece el pecho		Pausas del lactante			
si				activo		Las respeta			
no				pasivo		Las causa			
no lo requiere									
Cuando el niño hace pausa:									
Lo deja									
Lo estimula a succionar (masaje piso boca- apoyo mandibular - presion de mejilla- introducción dedo en boca)									
Le guía el pecho									
Lo retira									
NIÑO									
Peso antes de mamar (gr)					Peso post a mamar (gr)				
Diferencia con peso anterior					Aumento diario				
Examen físico niño	Tono musc			Reflejos:				Exámenes	
	Alerta			Búsqueda				Hemogluco test	
	Color			Succión/deglución				Bili Total	
	Hidratación			arcada				Bili dta	
	Actividad			Sensibilidad oral e intraoral					
Niño al pecho	Postura del niño					Postura del cuello			
	Actitud del niño durante alimentación (tranquilo - ansioso -Irritable)								
	selle labial			completo		Acople		Adecuado	
			parcial (escurre algo de leche por comisuras)		Inadecuado				
			sin selle						

	succión deglución (expresado en razón)		normal: 1 a 3:1	
			anormal: >3:1	
Pausas	coordinadas, Sin desprender retoma ritmo solo			
	descoordina, Se desprende, logra reinicio fácil y/o selle labial			
	Descoordinada, se desprende y requiere apoyo para volver			
Tiempo efectivo de succión en 5 ^{ta} mama D ^a e I ^a			Permanece alimento en boca post alimentación	
Se atora o tose (durante -post alimentación)				
Se cansa (polipneico/cianosis/sudoración)				
Niño con mamadera	Tipo de chupete (anticólico - normal -cae chorro - cae a goteo - fue intervenido)			
	ml ofrecidos		ml tomados/tiempo	
	Postura niño (acostado -semi sentado - sentado - posicionado con cojines)			
	Postura cuello (flexión - neutro - hiperextensión)			
	Actitud del niño durante alimentación (tranquilo - ansioso -Irritable)			
	selle labial	completo		
		parcial (escurre algo de leche por comisuras)		
		sin selle		
	succión deglución (expresado en razón)		normal: 1 a 3:1	
			anormal: >3:1	
	Pausas	coordinadas, Sin desprender retoma ritmo solo		
		descoordina, Se desprende, logra reinicio fácil y/o selle labial		
		Descoordinada, se desprende y requiere apoyo para volver		
	Se atora o tose (durante -post alimentación)			Permanece alimento en boca post alimentación
Se cansa (polipneico/cianosis/sudoración)				
Síntesis madre:				
Síntesis niño:				
Indicaciones:				
Próximo control:				
Evaluador (nombre y firma)				