



**TOLLESON
ANIMAL
CLINIC**

2735 S 99th Avenue Suite G-103
Tolleson, Arizona 85353
Phone: 623-936-7387 | Text: 623-471-7827 | Fax: 623 936-6295
www.tollesonanimalclinic.com

Discharge Instructions - Castration (Neuter)

Your pet has had a castration, more commonly known as a neuter. His testicles have been removed, so he will no longer be able to reproduce. For the next 12-24 hours, the anesthetic may cause him to be sleepy, uncoordinated, and possibly drool more than usual. He might also be sore or stiff for 2-3 days. To help him recover, please keep him indoors and protect him from hot, cold, or wet weather for the next 3-5 days. **Please notify us if you notice any of the following:**

- Excessive redness, swelling, or discharge from the incision
- Bleeding from the incision
- Your pet refuses to eat or is depressed after the first day home
- Vomiting or Diarrhea
- Your pet excessively licks or chews the incision, or your pet removes a suture
- There is a change in your pet's general health

Important Notes: Although his testicles have been removed, he will still have residual testosterone in his system for the next 30-45 days. During this time, he is still capable of impregnating unspayed females. To prevent accidental litters, please keep him away from any female dogs that may be in heat.

Please bring your pet back to our office for a re-examination of the incision in 10 days. This recheck is free of charge, and no appointment is necessary.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS:

Diet: Anesthesia can sometimes cause an upset stomach. To help prevent this, please feed your pet only 1/4 to 1/2 of his normal food amount tonight. Offer him small sips of water or a few ice chips. He can return to his regular diet and water intake tomorrow.

Exercise: LIMITED 10 DAYS Leash Walking only: **Avoid all running, jumping, and strenuous activity.**

Healing & Bathing: The sutures need to stay dry and unstretched for the incision to heal and seal properly. Do not bathe your pet during the healing process. Keep the incision site completely dry.
Sutures: The stitches used for the incision are internal and dissolvable. They do not need to be removed.

Special Instructions:

- To prevent your pet from licking or chewing their incision and causing an infection, we strongly recommend using an Elizabethan collar (E-collar). They should wear the E-collar continuously (24/7) until their re-check appointment in 10-14 days.
- If your pet has a small bandage on their leg, please remove it as soon as you get home. This was placed where the IV catheter was located.
- It is critical that you check the incision site daily. You must prevent your pet from licking, chewing, or scratching at the incision site. If your pet opens the incision (known as dehiscence) and it requires a second surgery (revision surgery) to close and repair the wound, the cost of that surgery and associated care will be the owner's responsibility. This revision surgery is not covered by the initial procedure fee.

If you have any questions, please call us at 623-936-7387. If a problem arises after business hours, call the nearest emergency hospital at 623-385-4555.



**TOLLESON
ANIMAL
CLINIC**

2735 S 99th Avenue Suite G-103
Tolleson, Arizona 85353
Phone: 623-936-7387 | Text: 623-471-7827 | Fax: 623-936-6295
www.tollesonanimalclinic.com

Instrucciones para después de la cirugía: castración

Su mascota ha sido castrada, más comúnmente conocida como castración. Le han extirpado los testículos, por lo que ya no podrá reproducirse. Durante las próximas 12 a 24 horas, la anestesia puede causarle somnolencia, falta de coordinación y posiblemente babeo más de lo habitual. También podría estar adolorido o rígido durante 2 a 3 días. Para ayudarlo a recuperarse, manténgalo dentro de casa y protéjalo del calor, el frío o la humedad durante los próximos 3 a 5 días. **Por favor notifíquenos si nota cualquiera de los siguientes:**

- Enrojecimiento excesivo, hinchazón o secreción de la incisión
- Hay un cambio en la salud general de su mascota
- Su mascota se niega a comer o está deprimida
- después del primer día en casa
- Vómitos o diarrea
- Su mascota lame o mastica excesivamente la incisión, o se quita una sutura
- Sangrado de la incisión

Notas importantes: Aunque le hayan extirpado los testículos, aún tendrá testosterona residual en su organismo durante los próximos 30 a 45 días. Durante este tiempo, aún podrá fecundar hembras no esterilizadas. Para evitar camadas accidentales, manténgalo alejado de las perras que puedan estar en celo. Traiga a su mascota a nuestra clínica para que le revisemos la incisión en 10 días. Esta revisión es gratuita y no necesita cita previa.

La incisión de su mascota debe volver a examinarse en nuestra oficina en 10 días. Esto es gratis. No se necesita cita previa.

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

Dieta: La anestesia a veces puede causar malestar estomacal. Para prevenirlo, alimente a su mascota solo con 1/4 o 1/2 de su comida habitual esta noche. Ofrezcale pequeños sorbos de agua o unos trocitos de hielo. Mañana podrá retomar su dieta y consumo de agua habituales.

Ejercicio: LIMITADO A 10 DÍAS Solo paseos con correa: Evite correr, saltar y realizar actividades extenuantes.

Cicatrización y baño: Las suturas deben permanecer secas y sin estirar para que la incisión cicatrice y selle correctamente. No bañe a su mascota durante el proceso de cicatrización. Mantenga la zona de la incisión completamente seca.

Suturas: Los puntos de sutura utilizados para la incisión son internos y reabsorbibles. No es necesario retirarlos.

Instrucciones especiales:

- Para evitar que su mascota lama o muerda la incisión y cause una infección, recomendamos enfáticamente el uso de un collar isabelino (E-collar). Debe usar el E-collar continuamente (24 horas al día, 7 días a la semana) hasta su cita de revisión en 10 a 14 días.
- Si su mascota tiene una pequeña venda en la pata, por favor retírela tan pronto como llegue a casa. Esta fue colocada donde se ubicó el catéter intravenoso.
- Es fundamental que revise el sitio de la incisión diariamente. Debe evitar que su mascota lama, muerda o rasque la incisión. Si su mascota abre la incisión (lo que se conoce como dehiscencia) y esto requiere una segunda cirugía (cirugía de revisión) para cerrar y reparar la herida, el costo de esa cirugía y la atención asociada serán responsabilidad del propietario. Esta cirugía de revisión no está cubierta por la tarifa del procedimiento inicial.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro número de teléfono 623-936-7387. Si surge un problema fuera del horario laboral, puede comunicarse con el hospital de emergencia más cercano al 623-385-4555.