



**TOLLESON
ANIMAL
CLINIC**

2735 S 99th Avenue Suite G-103
Tolleson, Arizona 85353
Phone: 623-936-7387 | Text: 623-471-7827 | Fax: 623 936-6295
www.tollesonanimalclinic.com

Discharge Instructions Feline - Castration (Neuter)

Your pet has had a castration, more commonly known as a neuter. His testicles have been removed, so he will no longer be able to reproduce. For the next 12-24 hours, the anesthetic may cause him to be sleepy, uncoordinated, and possibly drool more than usual. He might also be sore or stiff for 2-3 days. To help him recover, please keep him indoors and protect him from hot, cold, or wet weather for the next 3-5 days. **Please notify us if you notice any of the following:**

- Excessive redness, swelling, or discharge from the incision
- Bleeding from the incision
- Your pet refuses to eat or is depressed after the first day home
- Vomiting or Diarrhea
- Your pet excessively licks or chews the incision, or your pet removes a suture
- There is a change in your pet's general health

Important Notes: Although his testicles have been removed, he will still have residual testosterone in his system for the next 30-45 days. During this time, he is still capable of impregnating unspayed females. To prevent accidental litters, please keep him away from any female dogs that may be in heat.

Please bring your pet back to our office for a re-examination of the incision in 10 days. This recheck is free of charge, and no appointment is necessary.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS:

Diet: Anesthesia can sometimes cause an upset stomach. To help prevent this, please feed your pet only 1/4 to 1/2 of his normal food amount tonight. Offer him small sips of water or a few ice chips. He can return to his regular diet and water intake tomorrow.

Exercise: LIMITED 10 DAYS Leash Walking only: **Avoid all running, jumping, and strenuous activity.**

Healing & Bathing: The surgery site needs to stay dry and unstretched for the incision to heal and seal properly. Do not bathe your pet during the healing process. Keep the incision site completely dry.

Sutures & Litter Box: Your cat has no external sutures, so he should be kept out of dirt, sand or clay litter for at least 4 days. Shredded newspapers are a good alternative. Products made of compressed newspaper are available as well.

Special Instructions:

- To prevent your pet from licking or chewing their incision and causing an infection, we strongly recommend using an Elizabethan collar (E-collar). They should wear the E-collar continuously (24/7) until their re-check appointment in 10-14 days.
- If your pet has a small bandage on their leg, please remove it as soon as you get home. This was placed where the IV catheter was located.
- It is critical that you check the incision site daily. You must prevent your pet from licking, chewing, or scratching at the incision site. If your pet opens the incision (known as dehiscence) and it requires a second surgery (revision surgery) to close and repair the wound, the cost of that surgery and associated care will be the owner's responsibility. This revision surgery is not covered by the initial procedure fee.

If you have any questions, please call us at 623-936-7387. If a problem arises after business hours, call the nearest emergency hospital at 623-385-4555.



**TOLLESON
ANIMAL
CLINIC**

2735 S 99th Avenue Suite G-103
Tolleson, Arizona 85353
Phone: 623-936-7387 | Text: 623-471-7827 | Fax: 623 936-6295
www.tollesonanimalclinic.com

Instrucciones para después de la cirugía: castración

Su mascota ha sido castrada, más comúnmente conocida como esterilización. Se le han extirpado los testículos, por lo que ya no podrá reproducirse. Durante las próximas 12-24 horas, la anestesia puede causarle somnolencia, falta de coordinación y posiblemente salivación más de lo habitual. También podría sentir dolor o rigidez durante 2-3 días. Para ayudarlo a recuperarse, manténgalo en el interior y protéjalo del clima caluroso, frío o húmedo durante los próximos 3-5 días. **Por favor, notifíquenos si nota alguno de los siguientes síntomas:**

- Enrojecimiento, hinchazón o secreción excesiva de la incisión
- Sangrado de la incisión
- Su mascota se niega a comer o está deprimida después del primer día en casa
- Vómitos o diarrea
- Su mascota lame o mastica la incisión de manera excesiva, o se quita una sutura
- Hay un cambio en la salud general de su mascota

Notas importantes: Aunque se le han extirpado los testículos, todavía tendrá testosterona residual en su sistema durante los próximos 30-45 días. Durante este tiempo, todavía es capaz de preñar a hembras no esterilizadas. Para evitar camadas accidentales, manténgalo alejado de cualquier perra que pueda estar en celo.

Por favor, traiga a su mascota de regreso a nuestra clínica para un reexamen de la incisión en 10 días. Este chequeo es gratuito y no es necesaria una cita.

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

Dieta: La anestesia a veces puede causar malestar estomacal. Para ayudar a prevenir esto, por favor, alimente a su mascota solo con 1/4 a 1/2 de su cantidad normal de comida esta noche. Ofrezcale pequeños sorbos de agua o unos cuantos cubitos de hielo. Podrá volver a su dieta y consumo de agua regulares mañana.

Ejercicio: LIMITADO 10 DÍAS Solo caminar con correa: **Evite correr, saltar y cualquier actividad extenuante.**

Curación y baño: El sitio de la cirugía debe permanecer seco y sin estirarse para que la incisión sane y se selle correctamente. No bañe a su mascota durante el proceso de curación. Mantenga el área de la incisión completamente seca.

Suturas y caja de arena: Su gato no tiene suturas externas, por lo que debe mantenerse alejado de la tierra, arena o arena de arcilla durante al menos 4 días. Los periódicos triturados son una buena alternativa. También hay disponibles productos hechos de periódicos comprimidos.

Instrucciones especiales:

- Para evitar que su mascota lama o muerda la incisión y cause una infección, recomendamos enfáticamente el uso de un collar isabelino (E-collar). Debe usar el E-collar continuamente (24 horas al día, 7 días a la semana) hasta su cita de revisión en 10 a 14 días.
- Si su mascota tiene una pequeña venda en la pata, por favor retírela tan pronto como llegue a casa. Esta fue colocada donde se ubicó el catéter intravenoso.
- Es fundamental que revise el sitio de la incisión diariamente. Debe evitar que su mascota lama, muerda o rasque la incisión. Si su mascota abre la incisión (lo que se conoce como dehiscencia) y esto requiere una segunda cirugía (cirugía de revisión) para cerrar y reparar la herida, el costo de esa cirugía y la atención asociada serán responsabilidad del propietario. Esta cirugía de revisión no está cubierta por la tarifa del procedimiento inicial.

Si tiene alguna pregunta, por favor llámenos al 623-936-7387. Si surge un problema después del horario de atención, llame al hospital de emergencias más cercano al 623-385-4555.