


Une autre façon d'administrer **ERLEADA®**



Si vous avez de la difficulté à avaler les comprimés entiers, essayez cette méthode qui utilise de la compote de pommes.

ÉTAPE
1



Mélanger

Commencez par ajouter vos comprimés ERLEADA® à 120 mL (1/2 tasse) de compote de pommes. **Les comprimés doivent être entiers et non écrasés.** Mélangez la compote de pommes et les comprimés.

ÉTAPE
2



Remuer

Attendez **15 minutes**, puis remuez à nouveau le mélange. Après avoir attendu **15 minutes de plus**, vous devez remuer le mélange jusqu'à ce que les comprimés soient bien mélangés et que vous ne puissiez plus voir de morceaux.

ÉTAPE
3



Avaler

Lorsque vous ne voyez plus de morceaux, avalez le mélange immédiatement à l'aide d'une cuillère.

ÉTAPE
4



Rincer et boire

Pour vous assurer de prendre votre dose complète, **ajoutez** 60 mL (1/4 tasse) d'eau au contenant vide et buvez cette eau. **Répétez** une autre fois.

RAPPELEZ-VOUS :

- Avalez tout le mélange de compote de pommes et de médicament.
- Assurez-vous d'avaler le mélange dans l'heure qui suit sa préparation.
- Ne conservez pas le mélange de compote de pommes et de comprimés ERLEADA®.

Si vous avez des questions sur la façon de prendre ERLEADA®, veuillez consulter la notice d'accompagnement ou communiquer avec votre médecin.

