

WorkTrih

WorkTrih es un regulador de crecimiento que contiene promotores hormonales, aminoácidos, además de macro y micro nutrientes que actúan como cofactores sobre los procesos metabólicos y fisiológicos de las plantas, como son el crecimiento y elongación celular; incrementando el rendimiento y la calidad de las cosechas.

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Aspecto físico: Líquido

Color: Marrón Oscuro

Olor: Característico

Densidad: 1.20 g/ cm³ (20 °C)

Solubilidad: Completa en agua

Inflamabilidad: No inflamable

COMPONENTES

Composición	
MAGNESIO	2.20 %
ZINC	0.53 %
MANGANESO	0.50 %
ÁCIDOS FÚLVICOS	3.00 %
AMINOÁCIDOS	5.00 %
EXTRACTO DE ALGAS	2.50 %
Promotores Citoquinicos	2,400 ppm
Promotores Auxinicos	500 ppm
Promotores Giberelicos	500 ppm
Vitamina B1	0.20 %
Glicina Betaína	0.20 %
Acido Poliglutámico	0.20 %

FORMULACIÓN

Alta concentración de promotores hormonales y alta capacidad hidrofílica, haciéndolo 100 % soluble.

- ✓ Contiene Solución Orgánica nutriente estabilizante.
- ✓ Alta estabilidad de formulación. Sus componentes no sufren reacciones o cambios químicos.
- ✓ Concentraciones balanceadas de los nutrientes y promotores hormonales para potenciar el metabolismo y la productividad de la planta.

VENTAJAS: WorkTrih

- ✓ Actúa a nivel celular, estimulando la división y elongación celular.
- ✓ Favorece el proceso de fotosíntesis induciendo a la floración en los cultivos, dando mayor número de flores y por consiguiente mayor cantidad de frutos por planta.
- ✓ Favorece el cuajado, la tuberización y el desarrollo de frutos en los diversos cultivos.
- ✓ Proporciona a la planta mayores posibilidades de recuperación luego de pasar por condiciones de estrés (fisiológico, climático o de manejo agronómico).

RECOMENDACIONES DE USO

WorkTrih está preparado para ser utilizado en todo tipo de cultivos y con todos los plaguicidas de uso agrícola, nutrientes foliares y bioestimulantes. Se puede usar, de preferencia, vía foliar.

USO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Ají Páprika, Guajillo, Escabeche, Pimiento, Chile Ancho	250 – 500 cc en 200 litros de agua	Aplicar en cada Piso Floral, se recomiendan realizar tres aplicaciones en el cultivo.
Ají Panca	250 cc en 200 litros de Agua	Aplicar solo al Inicio de la Primera y Segunda Floración
Palto, Mango	250 cc en 200 litros de agua	Aplicar en plena floración y luego al inicio de cuajado
Manzano, Melocotón, Peral	250 cc en 200 litros de agua	Aplicar al 50% de flores abiertas
Cítricos	250 cc en 200 litros de agua	Aplicar cuando se observe un 25% de flores abiertas, luego al cuajado de frutos
Tomate	250 – 500 cc en 200 litros de agua	Aplicar en cada Piso Floral, se recomiendan realizar tres aplicaciones en el cultivo.
Hortalizas en general	250 cc en 200 litros de agua	Aplicar a los 15 días después del trasplante
Arándano	250 cc en 200 litros de agua	Aplicar después de la poda o inicio de brotamiento, luego aplicar al Inicio de Floración y luego 10 días después de la última aplicación
Arroz	250 – 500 cc en 200 litros de agua	Aplicar al inicio del Macollaje.
Papa	500 cc en 200 litros de agua	Aplicar antes del aporque, luego repetir a los 20 días después
Vid	1,0 – 1,50 litro/Ha	1era aplicación al inicio del botoneo, estado de Piña 2da aplicación al Inicio de floración o Cabeza de Alfiler 3era aplicación al Inicio de Cuajado
Fresa	250 cc en 200 litros de agua	Aplicar en cada Floración
Ajos	250 – 500 cc en 200 litros de agua	Aplicar entre la Sexta y Séptima Hoja y luego repetir a los 90 días después de la Siembra
Cebolla	250 – 500 cc en 200 litros de agua	Primera aplicación a los 30 DDT Segunda aplicación a los 60 DDT Tercera aplicación al crecimiento del Bulbo

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN

- Puede aplicarse con cualquier equipo convencional, por medio de aspersión al follaje.
- Una vez preparados deben ser aplicados inmediatamente.
- Su uso está permitido en cultivos orgánicos y/o biológicos.
- No tiene periodos de carencia y está exento de los requisitos de tolerancia de residuos (EPA), por lo que se puede usar en aplicaciones de pre-cosecha.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada cuando la aspersión haya secado sobre las hojas o después de una (1) hora de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

WorkTrih, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptos con lo de fuerte reacción alcalina, con alta presencia de Hidróxido de Potasio.

TOXICIDAD

Por sus características **WorkTrih**, no ofrece riesgo alguno a la salud, aunque se debe utilizar siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta.

WorkTrih, no es fitotóxico a los cultivos y las dosis recomendadas.

PRESENTACIONES COMERCIALES

- Frasco x 250 cc
- Frasco x 1 L
- Galonera x 5 L
- Bidón x 20 L

PRECAUCIONES DE USO

- Durante el manejo se deben tomar las precauciones propias de cualquier producto no destinado para consumo humano directo.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños, No exponer el producto al Sol ni a temperaturas extremas.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- El envase vacío No debe ser utilizado para conservar alimentos o agua para consumo.
- Lavarse las manos luego de manipular el producto y antes de comer, beber o fumar.
- No es tóxico ni peligroso para el medio ambiente.
- En caso de derrame, lavar con abundante agua.

- No es peligroso si se manipula y utiliza según las recomendaciones.

La Compañía garantiza la riqueza y composición del producto y no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado, por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Se recomienda su utilización bajo asesoramiento técnico agronómico.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico.

En caso de emergencia llame al siguiente número:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) ó 328-7398

ESSALUD: 117 (gratuito) **CISPROQUIM** 0800-5-0847