


# INDICACIONES PARA PREPARACIÓN COLÓNICA PREVIO A COLONOSCOPIA:

---



MEDICAMENTO PARA PREPARACION: **NULYTELY**

La preparación inicia 48 horas antes del procedimiento.

El primer día de la preparación puede desayunar completamente normal pero la comida y cena se debe tomar sólo líquidos claros, como son: jugos (no néctares), caldos (sólo el agua, no verduras), té, gelatina de agua, agua natural o de sabor.

El segundo día de la preparación se debe continuar tomando sólo líquidos claros durante todo el día (desayuno, comida y cena).

El segundo día de la preparación, se debe ingerir el **NULYTELY**.

La caja de **NULYTELY** contiene 4 sobres con polvo; deberá tomar los 4 sobres en 4 litros de agua, de la siguiente manera:

**A las \_\_\_\_\_**, vaciar el contenido de **UN SOBRE** de **NULYTELY** en **UN LITRO** de agua fría. Beber esta solución en un lapso de UNA HORA (un vaso de 250 ml cada 15 minutos).

**A las \_\_\_\_\_**, vaciar el contenido de **UN SOBRE** de **NULYTELY** en **UN LITRO** de agua fría. Beber esta solución en un lapso de UNA HORA (un vaso de 250 ml cada 15 minutos).

**A las \_\_\_\_\_**, vaciar el contenido de **UN SOBRE** de **NULYTELY** en **UN LITRO** de agua fría. Beber esta solución en un lapso de UNA HORA (un vaso de 250 ml cada 15 minutos).

**A las \_\_\_\_\_**, vaciar el contenido de un sobre de **NULYTELY** en UN LITRO de agua fría. Beber esta solución en un lapso de UNA HORA (un vaso de 250 ml cada 15 minutos).

**A las 8 pm** finaliza la preparación intestinal.

NOTA: Durante todo el día previo a su estudio (antes y después del NULYTELY) deberá estar consumiendo líquidos claros para asegurar una adecuada hidratación.

El día que se realice el estudio usted deberá tener un AYUNO de 8 horas. Por ejemplo, si el estudio se va a realizar a las 8 de la mañana, usted ya no podrá tomar ningún líquido desde las 12 de la noche del día anterior hasta después de que se realice el estudio; si usted se va a realizar su estudio a las 3 de la tarde, usted puede tomar líquidos a las 7 de la mañana y, después de esa hora ya no tomar ningún líquido hasta después de que se realice el estudio.

En caso de que usted tiene insuficiencia renal o toma cualquier medicamento de forma habitual, por favor póngase en contacto con nosotros para indicarle si puede seguir tomándolos o si los debe suspender.

En caso de que tenga DUDAS comuníquese con nosotros.