

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200510044232.8

[51] Int. Cl.

A61K 36/74 (2006.01)

A61K 36/70 (2006.01)

A61K 36/48 (2006.01)

A61K 36/47 (2006.01)

A61K 36/315 (2006.01)

A61K 36/27 (2006.01)

[45] 授权公告日 2007 年 3 月 21 日

[11] 授权公告号 CN 1305492C

[51] Int. Cl. (续)

A61K 36/24 (2006.01)

A61K 36/19 (2006.01)

A61K 36/185 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

[22] 申请日 2005.8.11

[21] 申请号 200510044232.8

[73] 专利权人 赵善芝

地址 265500 山东省烟台市福山区回里镇
谭家庄村

共同专利权人 赵传功

[72] 发明人 赵善芝 赵传功

[56] 参考文献

CN1333050A 2002.1.30

CN1615970A 2005.5.18

审查员 王 荧

权利要求书 1 页 说明书 5 页

[54] 发明名称

一种治疗白血病的中药组合物

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗白血病的中药组合物，是采用含有下列重量配比的原料制成的：青黛 1-4 份、长春花 1-2 份、喜树果 0.7-4 份、猪殃殃 0.5-10 份、榧树皮 10-20 份、一叶萩 15-30 份、三十六荡 2-4 份。本发明能有效治疗白血病，其见效快，无副作用，治愈率高，愈后不再复发。

1、一种治疗白血病的中药组合物，其特征在于其中制成有效成分的原料组成为：

青黛 1—4 份 长春花 1—2 份 喜树果 0.7—4 份 猪殃殃 0.5—10 份
榧树皮 10—20 份 一叶萩 15—30 份 三十六荡 2—4 份。

2、按照权利要求 1 所述的治疗白血病的中药组合物，其特征在于加入太子参 1—10 份。

3、按照权利要求 1 所述的治疗白血病的中药组合物，其特征在于加入：野百合 1—4 份，雄黄 0.7—2 份，砒石 1—5 份。

4、按照权利要求 1 所述的治疗白血病的中药组合物，其特征在于加入太子参 1—10 份，水蛭 2—3 份。

5、按照权利要求 1 所述的治疗白血病的中药组合物，其特征在于加入牛头皮胶 15—20 份。

一种治疗白血病的中药组合物

技术领域 本发明涉及治疗白血病的中草药组合物，属于中医药技术领域。

背景技术 白血病是人体的造血系统出现病变，是血液系统较难治疗的病症之一。白血病的种类很多，例如淋巴细胞白血病、单核细胞白血病、粒细胞白血病、淋巴肿瘤白血病、巨核细胞白血病、嗜酸（碱）细胞白血病、红白血病等。目前西医普遍采用化疗，而化疗所产生的毒副作用对人体损害极大，患者往往得不到满意的效果，却反而引起身体免疫功能低下等不良后果；而采用的骨髓移植法，虽然可以根除白血病，可由于骨髓相合的概率很低，许多患者找不到合适的骨髓来源，骨髓移植费用很高，患者不仅不易接受，而且也很痛苦。为避免西医治疗的缺陷，我国中医界也有人推出中草药组合物治疗白血病的方案，但在药物配伍上不尽合理，以致药理不通，有的中草药只可对白血病起到暂时缓解的假象，在很短时间内，病情很快又能加重复发，因而这些中草药不能达到有效治疗白血病的目的。

发明内容 本发明的目的是在于克服上述现有技术的不足，提供一种治疗白血病的中药组合物，该中药组合物能有效治疗白血病，且无副作用，见效快，治愈率高，愈后不再复发。

为实现本发明的上述目的，所采用的技术方案是：一种治疗白血病的中药组合物，其特征在于其中制成有效成分的原料组成为：

青黛 1—4 份 长春花 1—2 份 喜树果 0.7—4 份 猪殃殃 0.5—10 份
榧树皮 10—20 份 一叶萩 15—30 份 三十六荡 2—4 份。

为增加本发明治疗淋巴细胞白血病的治愈效果，可以在上述配方中加入太子参 1—10 份。

为增加本发明治疗粒细胞或巨核细胞及嗜酸（碱）细胞白血病的治愈效果，可在上述配方中加入：野百合 1—4 份，雄黄 0.7—2 份，砒石 1—5 份。

为增加本发明治疗淋巴肿瘤白血病的治愈效果，可在上述配方中加入太子参 1—10 份，水蛭 2—3 份。

为增加本发明治疗红细胞白血病的治愈效果，可在上述配方中加入牛头皮

胶 15—20 份。

本发明最好采用常规方法制成口服液。

当配方中加入雄黄及础石时，需先将雄黄及础石加工成粉末，当药液温度降为室温时，再加入搅拌均匀即可。

本发明所采用的青黛具有清热解毒、凉血、泻肝火的功效；所采用的长春花具有解毒抗癌、平肝降压等功效；所采用的喜树果具有破血化瘀、治癌散结等功效；所采用的猪殃殃具有凉血化瘀、通经等功效；所采用的樗树皮具有消积、润燥等功效；所采用的一叶萩具有刺激中枢神经等功效；所采用的三十六荡具有清热解毒等功效。这些中草药有机地配合在一起，不仅可有效地杀灭血液中的癌细胞，而且还能提高自身免疫能力，增强机体的抗病力，增加血小板的数量，凉肝健脾。本发明治疗效果好，见效快，且无副作用。90 年以来，通过采用本发明的中药组合物对 32 位患者的治疗，达到了意想不到的显著效果，有效率达到 96%，治愈率达 90%，愈后不再复发。

而本发明所采用的太子参具有补血、生津等功效；野百合具有清热、解毒等功效；雄黄具有攻毒、杀虫等功效；础石具有劫痰、平喘等功效；水蛭具有活血化瘀等功效；牛头皮胶具有补气血等功效。将这些药物加入组合物中，可更能增加相应病症治愈的速度及效果。

下面举出几个具体病例，进一步说明本发明的效果。

1、代某，女，54 岁，2000 年 6 月中旬出现乏力现象，经过一般治疗，乏力渐重，并出现颜面苍白。7 月 7 日，经医院检验结果为：血红蛋白 69g/L，红细胞 $2.3 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $7.5 \times 10^9/L$ ，血小板为 $10 \times 10^9/L$ ，淋巴细胞为 52.1%，确诊为急性淋巴细胞白血病。在某医院治疗一年多后，肝脾肿大，脉象洪大，管质红，苔黄腻，病情加重，局部可见细小紫红色颗粒。随后转到我所进行治疗，服用按照本发明配方煎成的药液，三天后就明显地见效，服用二个月后，肝脾正常，细小紫红色颗粒消失。检验结果为：红细胞 $4 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $4 \times 10^9/L$ ，血小板为 $120 \times 10^9/L$ ，淋巴细胞为 36.6%，已基本接近正常。此后，又继续巩固服药 3 年，未见复发。

服药方法为：每小时一次，每次 50ml，一天 10 次。巩固服药期间，按照服药方法，每次连续服用一个月，停服八个月后，再服用一个月，然后再停服

八个月，如此周而复始，直到满三年为至。

2、周某，女，40岁，2000年8月份出现发热、头痛、盗汗，颈部有少许淋巴结肿大，医院检验结果为：白细胞数为 $20 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $35 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $60 \times 10^9/L$ ，淋巴细胞为 61%，医院确诊为淋巴瘤白血病，在医院经过一段时间的治疗后，病情未见好转，且淋巴结增大，肝脾肿大，舌质暗色，苔白腻。2001年三月转我所治疗，服用按本发明配方煎成的药液，四天后即有明显效果，服用二个月后，已痊愈，检验结果为：红细胞 $3.7 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $5 \times 10^9/L$ ，血小板为 $105 \times 10^9/L$ ，淋巴细胞为 35%，又继续巩固服药三年，该患者至今未复发。

服药方法：同病例 1。

3、刘某，男，39岁，1999年出现乏力、多汗、消瘦厌食、反复低热、面色苍白、头晕症状，检验结果为：白细胞数为 $36.7 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $50 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $75.6 \times 10^9/L$ ，粒细胞为 76.5%，确诊为慢性粒细胞白血病，在医院治疗三个星期后，出现肝肿大，剧烈腹痛，下肢浮肿，紫癜，鼻腔及口腔出血，脉涩，舌紫，苔薄，之后转入我所治疗。服用按本发明配方煎成的药液，四天后即可见明显效果，服用二个月后，已痊愈。检验结果为：白细胞数为 $7 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $5 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $130 \times 10^9/L$ ，粒细胞为 51.6%，已基本正常，继续巩固服药四年，至今未见复发。

服药方法：同病例 1。

4、余某，男，40岁，1997年4月份，出现气短乏力，四肢浮肿，皮肤有紫斑，自汗，尿白，面色苍白，医院确诊为急性单核细胞白血病，经过医院保守治疗半年后，仍未见好转，并且还加重了。检验结果为：白细胞数为 $37.8 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $60.8 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $71.2 \times 10^9/L$ ，单核细胞为 45.6%，脉象弱无力，舌质淡且边有齿痕，苔白润，1997年11月份转入我所治疗。服用按本发明配方煎成的药液，三天后即有明显效果，继续服用本发明的药液二个月后，已基本正常，检验结果为：白细胞数为 $7 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $5 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $120 \times 10^9/L$ ，单核细胞为 6.8%。又继续巩固服药三年，至今未见复发。

服药方法：同病例 1。

5、崔某，女，47岁，92年2月份，出现头昏、严重性紫点，并且全身

无力，面色苍白，检验结果为：白细胞数为 $30 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $1.5 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $73 \times 10^9/L$ ，原始粒细胞为 41.5%，脉象洪数，舌质红，无苔，经医院诊断为低增生性急性白血病。92 年 5 月份来我所治疗，服用按本发明配方煎成的药液，三天后即有明显效果，继续服用本发明的药液二个月后，已基本正常。检验结果为：白细胞数为 $5.1 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $4.1 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $135 \times 10^9/L$ ，原始粒细胞为 1.8%。又继续巩固服药三年，至今未见复发。

服药方法：同病例 1。

6、于某，女，18 岁，94 年其眼眶内侧出现无病性肿块（绿色瘤），在阳光下暴露后，绿色素迅速消退，并伴有乏力、面色苍白、便秘、头昏。检验结果为：白细胞数为 $185 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $31.6 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $71.9 \times 10^9/L$ ，粒细胞为 75.6%，脉象细且无力，舌少苔且色淡，医院诊断为绿色瘤白血病。95 年二月份来我诊治疗，服用按本发明配方煎成的药液，三天后即有明显效果，继续服用本发明的药液二个月后，已基本正常。检验结果为：白细胞数为 $6.12 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $4.1 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $115 \times 10^9/L$ ，粒细胞为 46.8%。又继续巩固服药四年，至今无反复。

服药方法：同病例 1。

7、孙某，男，52 岁，95 年其肋骨疼痛，疲乏无力，贫血，肝、脾及淋巴结肿大，尿蛋白测定为阳性，检验结果为：白细胞数为 $71.8 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $56.7 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $67.1 \times 10^9/L$ ，浆细胞为 75%，脉象细无力，舌红，苔腻，医院诊断为浆细胞白血病。96 年一月份来我所治疗，服用按本发明配方煎成的药液，三天后即有明显效果，继续服用本发明的药液二个月后，已基本正常，检验结果为：白细胞数为 $7.65 \times 10^9/L$ ，红细胞为 $5.43 \times 10^{12}/L$ ，血小板为 $120 \times 10^9/L$ ，浆细胞为 2.1%，又继续巩固服药四年，至今无反复。

服药方法：同病例 1。

具体实施方式 下面结合具体实施的例子对本发明做进一步详细的描述。

实施例 1：称取青黛 10Kg、长春花 10 Kg、喜树果 7Kg 猪殃殃 5K g、榧树皮 100K g、一叶萩 150 Kg、三十六荡 20 Kg，混合后，按常规方法制成药物口服液。

实施例 2：称取青黛 40 Kg、长春花 20K g、喜树果 40Kg、猪殃殃 100 Kg、

榧树皮 200Kg、一叶萩 30 Kg、三十六荡 40 Kg，混合后，按常规方法制成药物口服液。

实施例 3：称取青黛 25 Kg、长春花 15 Kg、喜树果 23 Kg、猪殃殃 52 Kg、榧树皮 150 Kg、一叶萩 225Kg、三十六荡 30 Kg，混合后，按常规方法制成药物口服液。

实施例 4：称取青黛 10 Kg、长春花 15 Kg、喜树果 40 Kg、猪殃殃 50 Kg、榧树皮 15 Kg、一叶萩 200 Kg、三十六荡 40 Kg，混合后，按常规方法制成药物口服液。

实施例 5：对于粒细胞或巨核细胞及嗜酸（碱）细胞白血病，可在实施例 1--4 中分别加入：野百合 10—40Kg、雄黄 7—20 Kg、砒石 10—50 Kg。将野百合与实施例 1—4 中的其它原料混合后，按常规方法制成药物口服液，将雄黄、砒石加工成粉末，再加入常温下的药物口服液中搅拌均匀即可。

实施例 6：对于淋巴细胞白血病，可在实施例 1--4 中分别加入太子参 10—100 Kg。

实施例 7：对于淋巴肿瘤白血病，可在实施例 1--4 中分别加入太子参 10—100 Kg，水蛭 20—30 Kg。

实施例 8：对于红细胞白血病，可在实施例 1--4 中分别加入牛头皮胶 150—200 Kg。