

### CONCEPTO NUEVO PERO YA ES UN MOVIMIENTO










#### LA SOCIEDAD

- o Manejo regenerativo de Ranchos
- o Manejo integral de ranchos
- Asociación colombiana de ganadería regenerativa
- Verdes motivos
- ° Ranching for Profit
- o Fondo Mexicano para la Conservación
- SENDAS A.C.




### Esta ganadería es la que busca:

- \* Mantener los servicios ecosistémicos que proveen los pastizales
- \* Recuperar la fertilidad del suelo
- Reintegrar la diversidad de plantas y animales
- \* Hacer un mejor uso del agua
- Disminuir las emisiones de gases y otros contaminantes
- \* Respetar la vida animal



### Al mismo tiempo busca


- Reconectar el paisajelos herbívoros-la humanidad
- Producción de alimentos sanos
- Rentabilidad
- Equidad



#### Esta VISION

### Pondera la restauración de los recursos

- Suelo
- Biodiversidad
- ☐ Aire
- Agua





### Paradigmas que prevalecen

- o Manejar carga animal baja
- o Pastoreo selectivo (en sistema extensivo)
- El pastizal debe tener solo gramíneas
- Altura de pastoreo y tiempos de reposo fijos para los pastizales
- o Seleccionar ganado de talla grande
- o Insistir en razas especializadas ignorando razas criollas
- o Comprar progenitores de registro (ferias, ganaderías modelos)
- o Seleccionar animales por producción individual
- o Seleccionar animales por rasgos sin valor
- o Depender de insumos comerciales

# DE QUE FORMA LOGRAR LA RESTAURACIÓN



# Reintegrar la diversidad de plantas ¿Cómo, qué beneficios tiene, qué plantas?

#### Forraje

#### Hierba disponible y aceptada por los herbívoros

monocultivos vs.
múltiples especies





En distintos ecosistemas y sitios destinados al pastoreo hay una diversidad importante











Emasia	Digestibilidad	Proteína Cruda	Fibra Cruda	
Especie	(%)	(%)	(%)	
Guazuma. ulmifolia	73.5	11.7	28	
Diphysa minutifolia	72.1	10.9	22.4	
Leucaena lanceolata	66.8	15.7	33.1	
Serjania racemosa	44.9	9.0	30	
Randia punctata	87.6	13.1	11.7	
Commelina rufipes	65.2	15.2	26.8	
Ipomea purpurea	60.8	18.6	36.7	
Lasciasis rugelii	56.8	10.5	34.4	
Leucaena leucocephala	65.5	22.9	17.2	
Brachiaria dictyoneura	55.3	8.0	31.2	
Andropogun gayanus	77.4	9.2	30.8	
Megathyrsus maximus	57.7	6.9	34.3	
Hyparrhenia rufa	74.6	9.3	32.8	

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ESPECIES DE LA SELVA BAJA

Cuadro 5a. Análisis químico-nutricional de 34 especies consumidas por terneras pastoreadas en vegetación secundaria de selva mediana en la época húmeda 2006.

Nombre científico	PC	FDN	FDA	Cenizas		DIVMS	
	%				24 h	48 h	72 h
Acacia cornigera (L.) Willd.	26.2	41.9	28.4	8.6	37.2	45.9	48.5
Acacia fameciana L.	24.0	41.9	22.0	8.8	28.6	36.6	38.6
Adelia barbinervis Schlet Cham.	10.1	51.8	25.8	8.5	32.8	43.0	45.1
Bauhinia divaricata L.	10.9	38.2	24.7	8.5	38.3	42.1	43.1
Blechum brownei Juss.	12.3	29.3	23.4	7.5	44.4	56.7	57.9
Calliandra houstoniana (Mill.) Stan	d 20.2	39.0	34.0	8.7	24.5	26.4	27.2
Calyptocarpus vialis Less.	13.0	37.4	33.4	7.5	50.6	57.4	58.1
Capraria biflora L.	16.0	33.2	23.2	8.2	58.7	66.7	69.9
Coccoloba barbadensis Jacq.	10.9	52.5	41.9	8.5	16.2	19.1	21.3
Corchorus siliquosus	17.6	31.1	24.3	8.1	48.4	58.0	59.5
Croton cortesianus H.B.K.	18.7	31.9	24.7	8.3	56.6	64.8	68.4
Croton reflexifolius H.B.K.	17.3	51.7	36.1	8.0	34.9	52.0	52.4
Desmodium incanum DC. in DC.	15.9	39.8	28.1	8.6	23.4	24.3	28.1
Diphysa floribunda Peyritsch Dorstenia choconiana var. integrifo	16.5	25.0	21.9	8.5	50.0	57.7	58.6
Donn. Smith	14.9	27.5	20.9	7.2	60.6	70.3	71.1
Eugenia capuli (Schl. et Cham) Be	rg. 13.4	48.1	35.5	8.7	24.1	26.3	27.1
Guazuma ulmifolia Lam.	16.3	45.2	27.6	8.5	22.0	34.3	42.8
Hyptis verticillata Jacq. Merremia discoidesperma (Donn.	16.1	31.4	22.6	8.1	47.5	56.5	56.9
Smith) O'Donnell	18.9	33.6	21.4	8.0	54.5	67.4	68.9

Fuente: Martínez, 2008

#### COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE LA SELVA MEDIANA


### Compuestos secundarios

- ✓ Polifenoles
- ✓ Taninos
- ✓ Saponinas
- ✓ Cumarinas
- ✓ Oxalatos
- ✓ Flavonoides
- ✓ Alcaloides
- ✓ Otros




#### FENOLES Y TANINOS TOTALES EN ESPECIES ARVENSES QUE CONSUMEN LOS BOVINOS

Nambra ciantífica	fenoles	taninos		
Nombre científico Sida spinosa	totales, % 3.11	totales, %		
Indigofera thibaudiana	4.76	3.38		
Chamaecrista nictitans	13.76	13.19		
Ruellia nudiflora	1.44	1.35		
Tamonea curassavica	7.15	6.05		
Zornia diphylla	1.5	1.15		
Desmodium procumbens	2.45	1.8		
Gliricidia sepium	2.16	1.53		
Gonphrena globosa	1.58	1.24		
Guazuma ulmifolia	8.59	8.03		
Ipomea purpurea	9.18	8.22		
Randia punctata	14.48	13.78		
Solanum adscendens	2.69	2.00		
Aeschynomene americana.	3.13	2.74		
Lagasea mollis	1.39	1.24		



"Centros de Nutrición y Farmacias"






### Visión anterior

EL SUELO COMO UN SUSTRATO INERTE











#### Prácticas que prevalecen





#### El suelo esta vivo

- Materia orgánica (de plantas, animales, hongos y bacterias) mezclada con tierra mineral es la parte del suelo más activa y rica en nutrientes.
- La degradación de la sustancia orgánica se produce en varias fases e intervienen diferentes organismos.

Foto: Instituto Federal WSL

### TRANSITAR A SISTEMAS DE PASTOREO EFICIENTES

#### Pastoreo NO selectivo

#### Viejos paradigmas


- Manejar carga animal baja
- Pastoreo selectivo (en sistema extensivo)
- Altura, tiempos de pastoreo y reposo fijos para los pastizales
- El pastizal debe tener solo gramíneas

#### Para reflexionar

- Carga animal alta jugando con los tiempos de ocupación
- El ganado debe pastar en espacios limitados
- Los tiempos de recuperación de pasturas mas largos
- El pastoreo debe ser total
- > Implementar el despunte y repaso
- Hacer suplementación estratégica
- Permitir la diversidad de plantas

### Sistema de pastoreo

- ° El pastoreo controlado
- ° Carga animal instantánea alta
- No selectivo
- Con tiempos de ocupación cortos (desde horas a días)
- Tiempos de descanso adecuados








## PASTOREO EN POTREROS ADECUADOS

\*








Densidad (stocking rate)

- 500 UA/ha
- ° 1000 UA/ha
- 。 2000 UA/ha

### Arreglo de potreros

Numero y tamaño de potreros

52 potreros 20 animales



#### Eliminar la selectividad



Meta: que el ganado consuma todo lo que es forraje





LA PRESIÓN DE PASTOREO SOBRE LAS ESPECIES CAMBIA

#### "Todo en el potrero"

- ° Para comer "Parejo"
- Beber agua limpia en abrevaderos cercanos
- Concentrar el estiércol y orina sobre el suelo
- ° Pisotear en un solo espacio
- ° Entrar en descanso










### Menos uso de productos químicos para:

- o Proteger los organismos del suelo
- o Evitar la contaminación
- o Disminuir los gastos del rancho
- o Producir alimentos limpios y sanos



#### EL AGUA



shutterstock.com · 1364038004

Fotografía: shutterstock.com





### ALEJAR EL GANADO DE LAS FUENTES DE AGUA



#### Key line

- · Cosecha de agua
- · Retención de suelo





Fotografías: de Cosecha de lluvia

### Retención e infiltración de agua

- o Proyecto Cosecha de Lluvia
- o Productor: Felipe Lupercio
- o Lugar: Caborca, Sonora



#### Las razas y la selección


#### Viejos paradigmas

- ➤ Insistir en razas especializadas no adaptadas
- ➤ Seleccionar ganado grande
- Comprar progenitores de registro
- Seleccionar animales por producción individual
- ➤ Seleccionar animales por rasgos sin valor
- Depender de insumos comerciales

#### Para reflexionar


- La genética debe ser de ganado adaptado
- El ganado debe ser de menor talla
- Animales de bajo mantenimiento y alta fertilidad
- > Evaluar productividad por hectárea

#### Combinaciones de genotipos





#### Selección de individuos



Madurez temprana

Alta condición corporal inherente

Alta fertilidad

Eficiente conversión del pasto

Leche optima

Menor tamaño corporal

Deposición de grasa

Balance hormonal

