

甲氨蝶呤（注射液）

美妥捷®

扫描获取更多




本药品用于治疗什么？

广泛用于克罗恩病或溃疡性结肠炎患儿。



我需要服用这种药物多长时间？

本药物将用于长期控制您的炎症性肠病。



这种药物如何起作用？

甲氨蝶呤通过影响免疫系统来减轻炎症



在开始之前会进行哪些特殊检查？

用于筛查包括结核病在内的感染及对多种病毒免疫力的检测



我将如何被监控？

将定期进行血液检查、粪便检查、内窥镜检查 and/或其他影像学检查，以监测药物疗效及副作用。



如何使用此药物

可通过皮下/肌肉注射给药

- 通常每周注射一次
- 应补充叶酸（维生素B9）
- 可使用昂丹司琼帮助预防/减轻副作用
- 甲氨蝶呤禁与磺胺类抗生素（如复方磺胺甲噁唑/甲氧苄啶）联用。开始新药物治疗前务必咨询医疗团队。



副作用

- 服药后24-48小时内可能出现恶心、食欲不振、身体不适或疲倦感。

- 头痛和易怒

- 影响免疫系统的药物可能与感染风险增加相关，极少数情况下可能导致癌症。

- 可能引发肝脏和肺部炎症

- 可能导致骨髓功能减退

- 可能出现脱发



我在哪里能买到它？

在您的药房配药



我应该什么时候联系我的医生？

请在以下情况致电：

- 您想停药或已停药
- 您对任何副作用感到担忧

其他需要联系医生的情况：

- 发热或怀疑感染
- 如果您怀孕了



疫苗

✗ 活疫苗 —— 不安全
✓ 灭活疫苗 —— 安全