



Dans quel cas ce médicament est utilisé ?

Approuvé par Santé Canada, il est largement utilisé pour les enfants et adultes atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse.



Comment ce médicament agit-il ?

La prednisone agit en diminuant l'inflammation de différentes manières. Elle est très similaire à une hormone naturelle de l'organisme, le cortisol.



Comment utiliser ce médicament

Disponible sous forme de comprimés et en solution liquide.

Les effets bénéfiques de ce médicament se font généralement sentir après 1 ou 2 jours, mais cela peut aussi prendre un peu plus de temps dans certains cas. Continuez à prendre votre médicament.

Après quelques jours, la dose sera progressivement diminuée, tous les 5 à 7 jours environ, avant d'être définitivement arrêtée.



Lieu d'administration du traitement

Médicament sur ordonnance, à récupérer en pharmacie.



Combien de temps faut-il utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour contrôler votre maladie inflammatoire de l'intestin. Il ne sera pas utilisé pour la maintenir sous contrôle à long terme. Il pourra être repris en cas de besoin et en cas de poussée de votre maladie inflammatoire de l'intestin.



Surveillance pendant le traitement

Des analyses de sang régulières, des tests de selles, une endoscopie et/ou d'autres examens d'imagerie seront effectués pour surveiller la réponse et les effets secondaires traitement.



Effets secondaires

- Brûlures d'estomac (à prendre au milieu d'un repas)
- Insomnie (à prendre le matin)
- Sautes d'humeur
- Augmentation de l'appétit
- Plus d'énergie que d'habitude
- Glycémie élevée
- Pression artérielle élevée
- Risque d'infection
- Prise de poids
- Acné
- Accélération de la croissance des poils du visage et du corps

La majorité de ces effets secondaires, y compris la prise de poids, sont réversibles à la diminution ou à l'arrêt de la prednisone.

Les effets secondaires suivants surviennent principalement chez les personnes qui prennent de la prednisone souvent et/ou pendant une longue période :

- Faible taux de cortisol dans le sang
- Troubles osseux et oculaires
- Ralentissement de la croissance chez les enfants
- Ralentissement de la cicatrisation des plaies



Quand appeler mon médecin

Appelez votre médecin si :

- Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament
- Si vous êtes préoccupé par de possible effets secondaires
- Aggravation des symptômes de votre maladie inflammatoire de l'intestin comme du sang dans les selles, de la diarrhée et/ou douleur abdominale
- Si vous êtes enceinte



Vaccins



Vaccins vivants :
Non sécuritaires



Vaccins inactivés :
Sécuritaires