

5-ASA or Mesalamine (Oral)

MEZERA®, MEZAVANT®, PENTASA®, SALOFALK®, OCTASA®



Dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?

Il est utilisé de façon fréquente chez les enfants avec une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse.



Health
Canada


Santé Canada a également approuvé les 5-ASA pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse chez les adultes.

Scanner pour en savoir plus



Combien de temps doit-on utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour maîtriser la maladie inflammatoire de l'intestin et la maintenir sous contrôle à long terme.



Comment ce médicament agit-il ?

Les 5-ASA agissent localement afin de réduire l'inflammation dans les intestins.

Il y a plusieurs médicaments 5-ASA qui diffèrent selon leur voie d'administration et leur enrobage. Les médicaments 5-ASA oraux actuellement approuvés au Canada pour la MII sont : Mezavant, Pentasa, Salofalk et Octasa.



Comment utiliser ce médicament ?

-Disponible en comprimés : Mezavant, Octasa, Pentasa et Salofalk. Les comprimés de 5-ASA doivent être avalés sous leur forme complète et ne doivent pas être mâchés, écrasés, coupés ni dissous.

Bien que certaines personnes soient soulagées rapidement, cela peut prendre un peu plus de temps pour d'autres. Continuez à prendre votre médication.



Lieu d'administration du traitement

Médicament sous ordonnance, à récupérer à votre pharmacie.



Vaccins



Vaccins vivants
-Sécuritaires



Vaccins inactivés
-Sécuritaires



Surveillance pendant le traitement

Des analyses sanguines régulières, des analyses de selles, des endoscopies et/ou d'autres examens d'imagerie seront effectués pour surveiller la réponse, ainsi que les effets secondaires du traitement.



Effets secondaires

Une douleur abdominale, des diarrhées, nausées ou céphalées peuvent arriver.

Une inflammation du pancréas, des poumons, du foie, des reins et du cœur peut rarement arriver.



Quand faut-il appeler le médecin ?

Appelez si :

-Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament

-Si vous êtes inquiets par de possibles effets secondaires

-Aggravation des symptômes de votre MII comme du sang dans les selles, des diarrhées et/ou une douleur abdominale

-Si vous êtes enceinte