

Methotrexate (comprimés)


Scanner pour en savoir plus



Dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?

Il est utilisé de façon fréquente chez les enfants avec une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse.

Souvent utilisé en combinaison pour améliorer l'effet de d'autres traitements de maladies inflammatoires de l'intestin (entres autres, infliximab ou adalimumab) ou en médication additionnelle pour diminuer la formation d'anticorps contre d'autres médicaments (infliximab ou adalimumab), permettant ainsi d'optimiser les niveaux thérapeutiques de ces médicaments et d'améliorer la réponse à ceux-ci.



Comment ce médicament agit-il ?

Le méthotrexate est un médicament réduisant l'inflammation médiée par le système immunitaire.



Comment utiliser ce médicament ?

Disponible en comprimés.

- Généralement donné une fois par semaine à petite dose.
- L'ondansetron peut être utilisé pour prévenir/réduire les effets secondaires.
- Le méthotrexate ne devrait pas être pris en combinaison avec des antibiotiques contenant du sulfa tel que le triméthoprim ou le cotrimoxazole (Septra). Vérifiez toujours avec votre équipe médicale avant de débuter une nouvelle médication.



Lieu d'administration du traitement

Récupérez votre prescription à votre pharmacie.



Surveillance pendant le traitement

Des analyses sanguines régulières, des analyses de selles, des endoscopies et/ou d'autres examens d'imagerie seront effectués pour surveiller la réponse, ainsi que les effets secondaires du traitement.



Combien de temps doit-on utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour maîtriser la maladie inflammatoire de l'intestin et la maintenir sous contrôle à long terme. D'autres médicaments pourront être utilisés en combinaison avec le méthotrexate.



Tests spécifiques effectués avant le début du traitement

Test de dépistage des infections incluant la tuberculose et évaluation de l'immunité à divers virus.



Effets secondaires

Nausea, feeling unwell or tired for 24-48 hours after taking your dose.

- Nausée, fatigue ou sensation d'inconfort dans les 24-48h suivant votre dose.
- Céphalées et irritabilité
- De l'inflammation au niveau du foie et des poumons peut survenir
- Une diminution de la fonction de la moelle osseuse peut survenir
- Une perte de cheveux peut survenir
- Les médicaments qui affectent le système immunitaire peuvent aussi être associés à la survenue d'infections et très rarement de cancers.



Quand faut-il appeler le médecin ?

Appelez si :

- Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament
- Si vous êtes inquiets par de possibles effets secondaires

Autres raisons d'appeler le médecin :

- Si vous avez de la fièvre ou vous si vous pensez avoir une infection
- Si vous êtes enceinte



Vaccins



Vaccins vivants
-Non sécuritaires



Vaccins inactivés
Sécuritaires