

# Sulfasalazine



## Dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?

Il est utilisé de façon fréquente chez les enfants avec une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse.



Santé Canada a également approuvé la Sulfasalazine pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse chez les adultes.

Scanner pour en savoir plus



## Combien de temps doit-on utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour maîtriser la maladie inflammatoire de l'intestin et la maintenir sous contrôle à long terme.



## Comment ce médicament agit-il ?

La Sulfasalazine agit localement afin de réduire l'inflammation dans les intestins.



## Surveillance pendant le traitement

Des analyses sanguines régulières, des analyses de selles, des endoscopies et/ou d'autres examens d'imageries seront effectués pour surveiller la réponse, ainsi que les effets secondaires du traitement.



## Comment utiliser ce médicament ?

Disponible en comprimés et liquide.

Bien que certaines personnes soient soulagées rapidement, cela peut prendre un peu plus de temps pour d'autres. Continuez à prendre votre médication.



## Effets secondaires

Une douleur abdominale, des diarrhées, nausées ou céphalées peuvent arriver.

-Éruption cutanée. Parlez à votre médecin si vous avez une allergie au Sulfa.

-Une inflammation du pancréas, des poumons, du foie, des reins et du cœur peut rarement arriver.



## Lieu d'administration du traitement

Médicament sous ordonnance, à récupérer à votre pharmacie.



## Quand faut-il appeler le médecin ?

Appelez si :

-Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament

-Si vous êtes inquiets par de possibles effets secondaires

-Aggravation des symptômes de votre MII comme du sang dans les selles, des diarrhées et/ou une douleur abdominale

-Si vous êtes enceinte

## Vaccins

✓ Vaccins vivants  
-Sécuritaires

✓ Vaccins inactivés  
Sécuritaires