

Tofacitinib

XELJANZ®

Más información



¿Para qué se usa esta medicación?

Actualmente siendo estudiado para la colitis ulcerosa en niños/as



Health Canada ha aprobado el uso de tofacitinib para la colitis ulcerosa en adultos.



¿Cómo funciona esta medicación?

El Tofacitinib funciona bloqueando una parte específica del sistema inmune responsable de la inflamación. Pertenecce a un grupo de medicaciones llamadas inhibidores JAK.



Exámenes especiales antes de comenzar el tratamiento

Exámenes buscando infecciones como la tuberculosis y la inmunidad contra ciertos virus.



¿Cómo usar esta medicación?

Disponible como tabletas que deben tomarse dos veces al día.

Mientras se toma esta medicación, está prohibido comer pomelo o tomar jugo de pomelo.



¿Dónde se administra el tratamiento?

Complete su prescripción en su farmacia.



¿Cuánto tiempo debe usarse esta medicación?

Esta medicación se usará para controlar su EII y también para mantenerla bajo control durante un largo tiempo.



Controles durante el tratamiento

Exámenes de sangre regulares, de materia fecal, endoscopías y/u otros estudios por imágenes para monitorear la respuesta y los posibles efectos secundarios de la medicación.



Efectos secundarios

Bajos niveles de células rojas, células blancas, y/o plaquetas.

- Riesgo de infección
- Inflamación del hígado
- Aumento del colesterol en sangre
- Acné

Los siguientes efectos secundarios han ocurrido raramente en adultos, y son incluso más raros en niños/as:

- Trombosis (coágulos en la sangre)
- Eventos cardiovasculares mayores (ACV, infarto)
- Algunas formas de cáncer



¿Cuándo debo llamar a mi doctor?

Por favor llame si:

- Desea detener el tratamiento o ya lo ha hecho
- Si alguno de los efectos secundarios lo inquieta
- Empeoramiento de los síntomas de EII como sangre en las heces, diarrea y/o dolor abdominal
- Si te embarazas



Vacunas



Vacunas a virus vivos
-No son seguras



Vacunas a virus inactivados
-Seguras