

Budesonide EC

ENTOCORT EC®



¿Para qué se usa esta medicación?

Ampliamente utilizada en niños y adultos con enfermedad de Crohn.



Health Canada también ha aprobado el uso de budesonida para la colitis ulcerosa en adultos.



¿Cómo funciona esta medicación?

La budesonida funciona reduciendo la inflamación de diferentes maneras. Es muy similar a una hormona natural en tu cuerpo, el cortisol.



¿Cómo usar esta medicación?

Disponible como cápsulas que se toman una vez al día. Las cápsulas deben tragarse enteras, pero si es necesario, pueden abrirse y esparcir los pequeños gránulos que contienen en puré de manzana o similar. Los gránulos deben tragarse enteros sin romper, masticar o disolver.

Mientras se toma esta medicación, está prohibido comer pomelo o tomar jugo de pomelo.



¿Dónde se administra el tratamiento?

Complete su prescripción en su farmacia



¿Cuánto tiempo debe usarse esta medicación?

Esta medicación se usará para controlar su EII. Esta medicación no se usará para el control a largo término, pero puede reiniciarse en casos de recaídas de tu EII.



Controles durante el tratamiento

Exámenes de sangre regulares, de materia fecal, endoscopías y/u otros estudios por imágenes para monitorear la respuesta y los posibles efectos secundarios de la medicación.



Efectos secundarios

Cuando se utiliza tal que prescripto y por cortos períodos de tiempo, la budesonida produce pocos o ningún efecto secundarios.



¿Cuándo debo llamar a mi doctor?

Por favor llame si:

-Desea detener el tratamiento o ya lo ha hecho

-Si alguno de los efectos secundarios lo inquieta

-Empeoramiento de los síntomas de EII como sangre en las heces, diarrea y/o dolor abdominal

-Si te embarazas



Vacunas



Vacunas a virus vivos
-No son seguras



Vacunas a virus inactivados
-Seguras