

Prednisona

Más información



¿Para qué se usa esta medicación?

Ampliamente utilizada en niños con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa



Health Canada también ha aprobado el uso de prednisona para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa en adultos.



¿Cómo funciona esta medicación?

La prednisona funciona reduciendo la inflamación de diferentes maneras. Es muy similar a una hormona natural en tu cuerpo, el cortisol.



¿Cómo usar esta medicación?

-Disponible como tableta y líquido

Los beneficios de esta medicación pueden sentirse en 1 o 2 días, puede tomar un poco más de tiempo en algunas personas. Continúa tomando tu medicación.

Después de algunos días, las dosis van a ser disminuidas gradualmente cada 5-7 días aproximadamente, para luego ser suspendidas.



¿Dónde se administra el tratamiento?

Complete su prescripción en su farmacia



¿Cuánto tiempo debe usarse esta medicación?

Esta medicación se usará para controlar su EII. Esta medicación no se usará para el control a largo término, pero puede reiniciarse en casos de recaídas de tu EII.



Controles durante el tratamiento

Exámenes de sangre regulares, de materia fecal, endoscopías y/u otros estudios por imágenes para monitorear la respuesta y los posibles efectos secundarios de la medicación.



Efectos secundarios

- Acidez (debe tomarse con una comida)
- Insomnio (Debe tomarse a la mañana)
- Cambios de humor

- Más apetito de lo usual
- Más energía de lo usual
- Aumento del azúcar en sangre
- Aumento de la presión arterial
- Riesgo de infección
- Aumento de peso
- Acné
- Crecimiento acelerado de vello facial y corporal

La mayoría de estos efectos secundarios, incluida la ganancia de peso, son reversibles una vez disminuida o suspendidas las dosis de prednisona.

Los efectos secundarios siguientes suceden mayormente en quienes toman prednisona frecuentemente y/o durante un largo tiempo:

- Niveles bajos de cortisol en sangre
- Problemas de los huesos y los ojos
- Crecimiento más lento en los niños/as
- Curación más lenta de las heridas



¿Cuándo debo llamar a mi doctor?

Por favor llame si:

- Desea detener el tratamiento o ya lo ha hecho
- Si alguno de los efectos secundarios lo inquieta
- Empeoramiento de los síntomas de EII como sangre en las heces, diarrea y/o dolor abdominal
- Si te embarazas



Vacunas



Vacunas a virus vivos
-No son seguras



Vacunas a virus inactivados
-Seguras