

Methotrexate (inyectable)

METOJECT®



¿Para qué se usa esta medicación?

Ampliamente utilizada en niños con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa



¿Cuánto tiempo debe usarse esta medicación?

Esta medicación se usará para controlar su EII y también para mantenerla bajo control durante un largo tiempo



¿Cómo funciona esta medicación?

El metotrexato es una medicación que reduce la inflamación en el sistema inmune



Exámenes especiales antes de comenzar el tratamiento

Exámenes buscando infecciones como la tuberculosis y la inmunidad contra ciertos virus



¿Cómo usar esta medicación?

Disponible como inyección subcutánea/intramuscular

- Generalmente una inyección por semana.
- El ácido fólico (vitamina B9) debería ser suplementado.
- El ondansetrón puede usarse para prevenir/reducir los efectos secundarios.
- El metotrexato no debería usarse al mismo tiempo que antibióticos de la sulfa como el cotrimoxazol (Septra) o la trimetoprima. Siempre consulte con su equipo médico antes de empezar nuevas medicaciones.



Controles durante el tratamiento

Exámenes de sangre regulares, de materia fecal, endoscopías y/u otros estudios por imágenes para monitorear la respuesta y los posibles efectos secundarios de la medicación.



Efectos secundarios

Nausea, falta de apetito, sentirse mal o fatigado durante 24-48 horas después de recibir la dosis.

- Dolor de cabeza e irritabilidad
- Puede ocurrir inflamación del hígado y de los pulmones
- Puede ocurrir una disminución de la función de la médula ósea
- Puede ocurrir pérdida del cabello
- Las medicaciones que afectan al sistema inmune pueden asociarse al desarrollo de infecciones y muy raramente cáncer



¿Dónde se administra el tratamiento?

Complete su prescripción en su farmacia

Vacunas



Vacunas a virus vivos
-No son seguras



Vacunas a virus inactivados
-Seguras



¿Cuándo debo llamar a mi doctor?

Por favor llame si:

- Desea detener el tratamiento o ya lo ha hecho
- Si alguno de los efectos secundarios lo inquieta

Otras razones para llamar a su doctor:

- Si presentas fiebre o cree tener una infección
- Si te embarazas