


Vedolizumab

ENTYVIO®

Más información



¿Para qué se usa esta medicación?

Ampliamente utilizada en niños con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.



Health Canada también ha aprobado el uso de vedolizumab para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa en adultos.



¿Cómo funciona esta medicación?

Vedolizumab funciona impidiendo que las células blancas (sistema inmune) entren en el revestimiento del intestino grueso para estimular la inflamación.



¿Cómo usar esta medicación?

-Las dosis subsecuentes pueden darse de manera intravenosa cada 8 semanas. Usualmente las personas requieren dosis más frecuentes.

-Dosis subcutáneas cada dos semanas pueden ser una alternativa después de haber recibido las primeras dos dosis de carga.

-Si bien algunas personas notan beneficios rápidamente, puede tomar más tiempo en otros. Continúa tomando tu medicación.



¿Dónde se administra el tratamiento?

Las dosis intravenosas serán administradas en un hospital o centros de perfusión.

Las dosis pueden administrarse en casa, subcutáneas.



Exámenes especiales antes de comenzar el tratamiento

Exámenes buscando infecciones como la tuberculosis y la inmunidad contra ciertos virus.



¿Cuánto tiempo debe usarse esta medicación?

Esta medicación se usará para controlar su EII y también para mantenerla bajo control durante un largo tiempo.



Controles durante el tratamiento

Exámenes de sangre regulares, de materia fecal, endoscopías y/u otros estudios por imágenes para monitorear la respuesta y los posibles efectos secundarios de la medicación.



Efectos secundarios

Reacciones relacionadas a la perfusión como falta de aire, fiebre, erupciones, cambios en la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Ciertas medicaciones pueden administrarse para tratar y/o prevenir estos efectos secundarios.

-Las medicaciones que afectan el sistema inmune pueden asociarse al desarrollo de infecciones.

-Pueden aparecer dolores de cabeza o de las articulaciones.

-Congestión nasal/infección de las vías aéreas superiores.



¿Cuándo debo llamar a mi doctor?

Por favor llame si:

-Desea detener el tratamiento o ya lo ha hecho

-Si alguno de los efectos secundarios lo inquieta

Otras razones para llamar a su doctor:

-Si presentas fiebre o cree tener una infección

-Si te embarazas

-Nauseas, vómitos o dolor abdominal

-Si desarrollas dolores de cabeza, convulsiones, confusión, o problemas de la visión.



Vacunas

✗ Vacunas a virus vivos

-No son seguras



✓ Vacunas a virus inactivados

-Seguras