

إنفليكسيماب،

ريميكاد، أفصولا، إنفلكترا، رينفليكسيس



ما هي استعمالات هذا الدواء؟

يستخدم هذا الدواء لعلاج الأطفال المصابين بداء كرون أو التهاب القولون القرحي. تمّت المصادقة على استخدام هذا الدواء من قبل هيئة الصحة الكنديّة.



كما تم اعتماده لعلاج الأمراض الالتهابية الأخرى الناتجة عن اضطراب المناعة لدى البالغين مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية وغيرهما.



ما هي مدة استخدام هذا الدواء؟

يستخدم إنفليكسيماب للسيطرة على داء التهاب الأمعاء على المدى الطويل

ما هي الفحوصات التي يجب القيام بها قبل البدء في استخدامه؟



يجب التّأكد من خلوك من داء السل والتّنبّه من مناعتك ضدّ الفيروسات.



كيف يعمل هذا الدواء؟

يرتبط إنفليكسيماب بشكل انتقائي بعامل النخر الورمي وهو بروتين التهابي يلعب دوراً رئيسياً في نشوء العديد من الأمراض الالتهابية. بمجرّد ارتباطه بعامل النخر الورمي يعوق قدرته على التفاعل مع الخلايا في الجسم، ممّا يقلّل من الالتهاب والأعراض المصاحبة.



ما هي الفحوصات التي يجب القيام بها أثناء استخدامه؟

ستحتاج إلى فحوصات دم دورية بما في ذلك قياس مستوى إنفليكسيماب، تحليل البراز، تنظير القولون وفحوصات أشعة للتأكد من استجابتك للدواء وخلوك من أية أعراض جانبية.



كيف يتم استخدام هذا الدواء؟

تُحقّن كلّ الجرعات في الوريد

- يتمّ إعطاء الجرعات الثلاث الأولى في الأسابيع 0 (صفر)، 2، (اثنا عشر) و6 (ستّة).

- تُعطى الجرعات اللاحقة كلّ أربعة إلى ثمانية أسابيع. قد يحتاج بعض المرضى إلى إعادة جرعات التّحميل أو إلى أجالٍ أقرب بالنسبة للجرعات التّالية.

- قد تشعر بتحسن بعد فترة قصيرة من بدء العلاج، ولكن التّحسن يكون أبطأ لدى بعض المرضى. من المهمّ مواصلة أخذ الجرعات.

تُستخدم بعض الأدوية الفمويّة مثل ميثوتركسات أو آزاثيوبرين بشكل مُتزامن لتجنّب ظهور الأجسام المضادّة لإنفليكسيماب.



ما هي الأعراض الجانبية؟

حساسية الدواء وتتمثّل أعراضها في ضيق التّنفس، الحمّى، الطفح الجلدي، انخفاض مستوى ضغط الدّم أو ارتفاع مستوى دقات القلب. يتمّ تقديم الدّواء اللّازم لتفادي أو علاج هذه الحوادث

الصداع-

الطفح الجلدي-

الأدوية المثبّطة للمناعة قد تتسبب في حدوث عدوى أو- نادراً أمراض خبيثة

الصداع-

من فضلك اتّصل بالطبيب إذا:

كنت تريد أو استدعت حالتك -التوقف عن استخدام إنفليكسيماب
كانت لديك مخاوف بخصوص الأعراض الجانبية
أسباب أخرى تستدعي الاتصال بالطبيب:
-الحمّى أو العدوى
الحمل



أين يتم إعطاء إنفليكسيماب؟

يتمّ حقن إنفليكسيماب في المستشفى أو في العيادات المتخصّصة.

التطعيمات؟

ليس من الآمن الحصول على لقاحات حيّة أثناء استخدام إنفليكسيماب.

