

5-ASA or Mesalamina (Oral)

MEZERA®, MEZAVANT®, PENTASA®, SALOFALK®, OCTASA®




¿Para qué se usa esta medicación?

Ampliamente utilizada en niños con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.



Health Canada también ha aprobado el uso de 5-ASA para la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa en adultos.



¿Cómo funciona esta medicación?

5-ASA funciona de manera local para reducir la inflamación en el intestino.

Existen numerosas medicaciones que contienen 5-ASA que difieren en cuanto a la forma de administración o el envoltorio de esta.

Actualmente las medicaciones orales con 5-ASA aprobadas en Canada para las EII incluyen: Mezavant, Pentasa, Salofalk, y Octasa.



¿Cómo usar esta medicación?

-Disponible como tableta: Mezavant, Octasa, Pentasa, Salofalk. Las tabletas de 5-ASA deben tragarse sin masticar, aplastar, cortar o disolver en líquidos.

-Si bien algunos individuos notan beneficios rápidamente, puede tomar más tiempo en otros. Continúa tomando tu medicación.



¿Dónde se administra el tratamiento?

Complete su prescripción en su farmacia



¿Cuánto tiempo debe usarse esta medicación?

Esta medicación se usará para controlar su EII y también para mantenerla bajo control durante un largo tiempo.



Controles durante el tratamiento

Exámenes de sangre regulares, de materia fecal, endoscopías y/u otros estudios por imágenes para monitorear la respuesta y los posibles efectos secundarios de la medicación.



Efectos secundarios

Pueden ocurrir dolor abdominal, diarrea, náuseas, o dolores de cabeza.

-Muy raramente puede ocurrir inflamación del páncreas, pulmones, hígado, riñones, o el corazón.



¿Cuándo debo llamar a mi doctor?

Por favor llame si:

-Desea detener el tratamiento o ya lo ha hecho

-Si alguno de los efectos secundarios lo inquieta

-Empeoramiento de los síntomas de EII como sangre en las heces, diarrea y/o dolor abdominal

-Si te embarazas



Vacunas



Vacunas a virus vivos
-Seguras



Vacunas a virus inactivados
-Seguras