

# ميثوتريكسات (للحقن)

ميتوجيكت

ابحث عن المزيد



CIDSCaNN  
Canadian Children Inflammatory Bowel Disease Network



## ما هي استعمالات هذا الدواء؟

يستخدم هذا الدواء لعلاج الأطفال المصابين بداء كرون أو التهاب القولون القرصي.



## ما هي مدة استخدام هذا الدواء؟

يستخدم ميثوتريكسات للسيطرة على داء التهاب الأمعاء إلى المدى الطويل.



## كيف يعمل هذا الدواء؟

يعمل ميثوتريكسات على تخفيف الالتهاب بتقليل نشاط الجهاز المناعي.



## ما هي الفحوصات التي يجب القيام بها قبل البدء في استخدامه؟

يجب التأكد من خلوك من داء السل والتثبّت من مناعتك ضدّ الفيروسات.



## ما هي الفحوصات التي يجب القيام بها أثناء استخدامه؟

ستحتاج إلى فحوصات دم دورية، تحليل البراز، تنظيف ن وفحوصات أشعة للتأكد من استجابتك للدواء وخلوك من أية أعراض جانبية.



## كيف يُستخدم هذا الدواء؟

ميثوتريكسات متوفّر للحقن تحت الجلد أو عضليًا.

يتم حقن الجرعة مرّة واحدة أسبوعيًا.

يجب إضافة حمض الفوليك (فيتامين ب9).

لا يجب استخدام ميثوتريكسات تزامنًا مع المضادّات الحيوية مثل تريموكسازول و تريميثوبريم (سبترا) عليك دائمًا استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل البدء في استخدام دواء جدي.



## ما هي الأعراض الجانبية؟

الغثيان، فقدان الشهية، الإحساس بالتعب لمدة 24 أو ساعة بعد الجرعة 48.

الصداع و التهيج

إلتهاب الكبد أو الإلتهاب الرئوي

تساقط الشعر

الأدوية المثبطة للمناعة قد تتسبب في حدوث عدوى او

نادرا امراض خبيثة



## أين يتم حقن الدواء؟

إصرف وصفتك الطبية من صيدليّتك



ليس من الآمن الحصول على لقاحات حيّة أثناء استخدام أداليموماب.



## التطعيمات؟

إستخدام اللقاحات المعطّلة آمن



## متى أتصل بالطبيب؟

من فضلك أتصل بالطبيب إذا كنت تريد أو استدعت حالتك التوقف عن استخدام الدواء. كانت لديك مخاوف بخصوص الأعراض الجانبية.

أسباب أخرى تستدعي الاتصال بالطبيب  
الحمى أو العدوى -  
الحمل -