



Tofacitinib

XELJANZ®



Dans quel cas ce médicament est utilisé ?

Approuvé par Santé Canada, il est largement utilisé pour les enfants et adultes atteints de colite ulcéreuse.



Combien de temps faut-il utiliser ce médicament ?

Ce médicament peut être utilisé pour maîtriser votre maladie inflammatoire de l'intestin et la maintenir sous contrôle à long terme.



Comment ce médicament agit-il ?

Le Tofacitinib agit en ciblant une partie spécifique du système immunitaire responsable de l'inflammation. Il appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de JAK.



Surveillance pendant le traitement

Des analyses de sang régulières, des tests de selles, une endoscopie et/ou d'autres examens d'imagerie seront effectués pour surveiller la réponse et les effets secondaires traitement.



Tests spéciaux effectués avant le début du traitement

Dépistage des infections, y compris la tuberculose, et évaluation de l'immunité à divers virus.



Effets secondaires

-Faible taux de globules rouges, de globules blancs et/ou de plaquettes.

- Risque d'infection
- Inflammation du foie
- Cholestérol sanguin élevé
- Acné

Les effets indésirables suivants se sont rarement produits chez les adultes et sont encore plus rares chez les enfants :

- Thrombose (caillots sanguins)
- Événements cardiovasculaires majeurs (accident vasculaire cérébral, crise cardiaque)
- Certaines formes de cancer



Comment utiliser ce médicament ?

Disponible sous forme de comprimés, à prendre deux fois par jour.

Pendant le traitement, vous ne devez pas manger de pamplemousse ni boire de jus de pamplemousse.



Lieu d'administration du traitement

Médicament sur ordonnance, à récupérer en pharmacie.



Quand appeler mon médecin

Appelez votre médecin si :

-Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament

- Si vous êtes préoccupé par de possible effets secondaires
- Aggravation des symptômes de votre maladie inflammatoire de l'intestin comme du sang dans les selles, de la diarrhée et/ou douleur abdominale
- Si vous êtes enceinte

Vaccins

Vaccins vivants :
non sécuritaires

Vaccins inactivés :
sécuritaires

