Scanner pour en savoir plus

CIDsCaNN
Canadian Children Inflammatory Bowel Disease Network

Methotrexate (injection)

METOJECT®

Dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?

Il est utilisé de façon fréquente chez les enfants avec une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse.

Comment ce médicament agit-il ?

Le méthotrexate est un médicament réduisant l'inflammation médiée par le système immunitaire.

Comment utiliser ce médicament ?

Disponible en injections sous-cutanées ou intra-musculaires.

-L'acide folique (vitamine B9) devrait être supplémentée avec ce traitement.

-L'ondansetron peut être utilisé pour prévenir/réduire les effets secondaires.

Le méthotrexate ne devrait pas être pris en combinaison avec des antibiotiques contenant du sulfa tel que le triméthoprime ou le cotrimoxazole (Septra). Vérifiez toujours avec votre équipe médicale avant de débuter une nouvelle médication.

Lieu d'administration du traitement

Récupérez votre prescription à votre pharmacie.

Vaccins

✖ Vaccins vivants
-Non sécuritaires

✔ Vaccins inactivés
Sécuritaires

Combien de temps doit-on utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour maîtriser la maladie inflammatoire de l'intestin et la maintenir sous contrôle à long terme.

Tests spécifiques effectués avant le début du traitement

Test de dépistage des infections incluant la tuberculose et évaluation de l'immunité à divers virus.

Surveillance pendant le traitement

Des analyses sanguines régulières, des analyses de selles, des endoscopies et/ou d'autres examens d'imageries seront effectués pour surveiller la réponse, ainsi que les effets secondaires du traitement.

Effets secondaires

-Nausée, perte d'appétit, fatigue ou sensation d'inconfort dans les 24-48h suivant votre dose.

-Céphalées et irritabilité

-De l'inflammation au niveau du foie et des poumons peut survenir

-Une perte de cheveux peut survenir

-Les médicaments qui affectent le système immunitaire peuvent aussi être associés à la survenue d'infections et très rarement de cancers.

Quand faut-il appeler le médecin ?

Appelez si :
-Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament
-Si vous êtes inquiets par de possibles effets secondaires

Autres raisons d'appeler le médecin :
-Si vous avez de la fièvre ou vous si vous pensez avoir une infection
-Si vous êtes enceinte

Copyright 2025 CIDsCaNN (cidscann.ca)