

فيدوليزوماب

أنثيفيو

ابحث عن المزيد



ما هي استعمالات هذا الدواء؟

يستخدم هذا الدواء لعلاج الأطفال المصابين بداء-
كرون أو التهاب القولون القرخي.



تمت المصادقة على استخدامه من قبل-
هيئة الصحة الكندية لدى البالغين المصابين
بداء كرون أو التهاب القولون القرخي.



ما هي مدة استخدام هذا الدواء؟

يستخدم هذا الدواء للسيطرة على داء التهاب الأمعاء على
المدى الطويل.



ما هي الفحوصات التي يجب القيام بها أثناء استخدامه؟

ستحتاج إلى فحوصات دم دورية، تحليل البراز، تنظيف
القولون وفحوصات أشعة للتأكد من استجابتك للدواء
وخلوك من أية أعراض جانبية.



كيف يعمل هذا الدواء؟

يعمل فيدوليزوماب على منع خلايا الدم البيضاء من
الدخول إلى بطانة الأمعاء.



ما هي الأعراض الجانبية؟

حساسية الدواء وتتمثل أعراضها في ضيق-
التنفس، الحمى، الطفح الجلدي، انخفاض مستوى
ضغط الدم أو ارتفاع مستوى دقات القلب. يتم
تقديم الدواء اللازم لتفادي أو علاج هذه الحوادث.

الأدوية المثبطة للمناعة قد تتسبب في حدوث عدوى-

الصداع أو أوجاع المفاصل-

احتقان الأنف/ التهاب الجهاز التنفسي العلوي-



كيف يُستخدم هذا الدواء؟

تُحقن أول ثلاث جرعات في الوريد في الأسابيع صفر
0، 1، 2 وستة 6.

تُعطى الجرعات اللاحقة في الوريد كل أسبوعين. قد يحتاج بعض
المرضى إلى جرعات متقاربة أكثر.

تُعتبر الجرعات بالحقن تحت الجلد خياراً متاحاً بعد جرعات التحميل.

مع أن بعض المرضى يلاحظون تحسناً سريعاً، قد يستغرق الأمر عدة
أسابيع لملاحظة تحسن الأعراض عند آخرين. من المهم الاستمرار في
استخدام الدواء، حتى لو لم تلاحظ تحسناً فوراً.



أين يتم أخذ الدواء؟

يتم حقن الجرعات الوريدية في المستشفى أو في
العيادات المتخصصة.

يمكن أخذ الجرعة تحت الجلد في المنزل.



متى أتصل بالطبيب؟

من فضلك اتصل بالطبيب إذا
كنت تريد أو استدعت حالتك التوقف عن استخدام الدواء.

كانت لديك مخاوف بخصوص الأعراض الجانبية

أسباب أخرى تستدعي الاتصال بالطبيب:

- الحمى أو العدوى

- الحمل

إذا كان لديك صداع، صرع، ارتباك عقلي أو-

اضطرابات في الرؤية.



ما هي الفحوصات التي يجب القيام بها قبل البدء في استخدامه؟

يجب التأكد من خلوك من داء السل والتثبيث من
مناعتك ضد الفيروسات.



ليس من الآمن الحصول
على لقاحات حية أثناء
استخدام آداليموماب.

التطعيمات؟

استخدام اللقاحات المعطلة
آمن

