

Azathioprine

IMURAN®

Más información



¿Para qué se usa esta medicación?

Ampliamente utilizada en niños con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa



¿Cómo funciona esta medicación?

La azatioprina impacta el sistema inmune para reducir la inflamación



¿Cómo usar esta medicación?

Disponible como tableta

- Generalmente en una dosis diaria
- Puede llevar 6-12 semanas para funcionar. Continúa tomando tu medicación



¿Dónde se administra el tratamiento?

Complete su prescripción en su farmacia



Exámenes especiales antes de comenzar el tratamiento

Exámenes sanguíneos pueden ser necesarios antes de comenzar



¿Cuánto tiempo usar esta medicación?

Esta medicación se usará para controlar su EII y también para mantenerla bajo control durante un largo tiempo. Otras medicaciones pueden usarse en combinación con la azatioprina



Vacunas



Vacunas a virus vivos
-No son seguras



Vacunas a virus inactivados
-Seguras



Controles durante el tratamiento

-Se realizarán exámenes de sangre regulares para controlar la aparición de efectos secundarios. La frecuencia de estos exámenes va a ser determinada por su equipo tratante.

-Exámenes de materia fecal, endoscopías y/u otros estudios por imágenes se realizarán para monitorear la respuesta a la medicación.

-La cantidad de azatioprina en tu sangre puede ser monitoreada para asegurar que estás recibiendo suficiente pero no demasiado.



Efectos secundarios

-Nausea, vómitos y dolor abdominal pueden ocurrir. Toma la medicación con comida para disminuir estos efectos secundarios.

-Pueden ocurrir pérdida temporal del cabello, erupciones de la piel, inflamación del páncreas y el hígado, disminución de la función de la médula ósea.

-Las medicaciones que afectan al sistema inmune pueden asociarse al desarrollo de infecciones y muy raramente cáncer.

-En pacientes con riesgo aumentado de cáncer de la piel, la exposición al sol y los rayos UV deben limitarse, y los pacientes deben utilizar vestimenta protectora y protector solar con un alto índice de protección.



¿Cuándo debo llamar a mi doctor?

Por favor llame si:

- Deseas detener el tratamiento o ya lo ha hecho
- Si alguno de los efectos secundarios lo inquieta

Otras razones para llamar a su doctor:

- Si presentas fiebre o cree tener una infección
- Si te embarazas
- Nauseas, vómitos o dolor abdominal