



ما هي استعمالات هذا الدواء؟

يستخدم هذا الدواء لعلاج الأطفال والبالغين المصابين بداء كرون أو التهاب القولون القرحي.



كيف يعمل هذا الدواء؟

يعمل أزاثيوبيرين على تعديل نشاط جهاز المناعة مما يخفف من الإلتهاب.



كيف يُستخدم هذا الدواء؟

مُتاح في شكل أقراص فموية

تُعطى الجرعة لمرة يوميًا

قد يحتاج إلى فترة قد تصل إلى 6-12 أسبوع قبل أن يصل إلى قمة فعاليته. من فضلك واصل تناول الدواء خلال هذه الفترة.



أين يتم أخذ الدواء؟

إصرف وصفتك الطبية من صيدليتك

ما هي الفحوصات التي يجب القيام بها قبل البدء في استخدامه؟



قد نقوم بفحوصات الدم قبل البدء باستخدام أزاثيوبيرين



ما هي مدة استخدام هذا الدواء؟

يستخدم أزاثيوبيرين للسيطرة على داء التهاب الأمعاء على المدى الطويل.

يمكن استخدام أدوية أخرى تزامنا مع أزاثيوبيرين



ما هي الفحوصات التي يجب القيام بها أثناء استخدامه؟

يجب طلب فحوصات دم دورية للتأكد من عدم حدوث أعراض جانبية. يقوم طبيبك المباشر بتحديد نسق المتابعة.

نحتاج إلى تحليل البراز، التنظير وفحوصات أشعة للتأكد من استجابتك للدواء.

قد نقوم بقياس مستوى أزاثيوبيرين في الدم للتأكد من أنك تأخذ جرعة كافية و غير مُبالغة.



ما هي الأعراض الجانبية؟

الغثيان، التقيؤ وأوجاع البطن. فم بأخذ أزاثيوبيرين مع الأكل لتجنب هذه الأعراض.

تساقط مؤقت للشعر، ظهور بثور على الجلد، إتهاب البنكرياس أو الكبد، أو انخفاض في خلايا الدم.

بالنسبة للأشخاص المعرضين للإصابة بسرطان الجلد، يجب الحد من مدة التعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية. يجب عليهم أيضا إرتداء ملابس واقية وإستخدام واقي شمسي بعامل حماية عالي.



متى أتصل بالطبيب؟

من فضلك أتصل بالطبيب إذا

كنت تريد أو استدعت حالتك التوقف عن استخدام الدواء.

كانت لديك مخاوف بخصوص الأعراض الجانبية

أسباب أخرى تستدعي الاتصال بالطبيب:

الحُمى أو العدوى -

الحمل -

الغثيان، التقيؤ وأوجاع البطن -

التطعيمات؟



ليس من الآمن الحصول على لقاحات حية أثناء استخدام أداليموماب.

إستخدام اللقاحات المعطلة آمن