



# Budesonide MMX

CORTIMENT®



## Dans quel cas ce médicament est utilisé ?

Approuvé par Santé Canada, il est largement utilisé pour les enfants et adultes atteints de

Health Canada colite ulcéreuse.



## Combien de temps faut-il utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour contrôler votre maladie inflammatoire de l'intestin. Il ne sera pas utilisé pour la maintenir sous contrôle à long terme. Il pourra être repris en cas de besoin et en cas de poussée de votre maladie inflammatoire de l'intestin.



## Comment ce médicament agit-il ?

Le Budésonide agit en diminuant l'inflammation locale de différentes manières. Il est très similaire à une hormone naturelle de l'organisme, le cortisol.



## Surveillance pendant le traitement

Des analyses de sang régulières, des tests de selles, une endoscopie et/ou d'autres examens d'imagerie seront effectués pour surveiller la réponse et les effets secondaires traitement.



## Tests spéciaux effectués avant le début du traitement

Les personnes souffrant d'une allergie grave aux arachides et/ou à l'orge ne doivent pas utiliser ce médicament.



## Effets secondaires

Lorsqu'il est pris conformément à la prescription et pendant de courtes périodes, le Budésonide n'entraîne que peu ou pas d'effets secondaires.



## Comment utiliser ce médicament ?

Disponible sous forme de gélules, à prendre une fois par jour. Les gélules doivent être avalées entières, mais si nécessaire, elles

peuvent être ouvertes pour saupoudrer les petites billes qu'elles contiennent dans de la compote de pommes. Les billes doivent être avalées sans être écrasées, mâchées ou dissoutes.

Pendant le traitement, il est interdit de manger des pamplemousses ou de boire du jus de pamplemousse.



## Quand appeler mon médecin

Appelez votre médecin si:

-Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament

- Si vous êtes préoccupé par de possible effets secondaires
- Aggravation des symptômes de votre maladie inflammatoire de l'intestin comme du sang dans les selles, de la diarrhée et/ou douleur abdominale
- Si vous êtes enceinte



## Lieu d'administration du traitement

Médicament sur ordonnance, à récupérer en pharmacie.



## Vaccins

-Vaccins vivants : non sécuritaires -Vaccins inactivés : sécuritaires