

# 英夫利昔单抗

REMICADE®, AVSOLA®\*, INFLECTRA®\*, RENFLEXIS®\*

\*生物类似药

扫描获取更多



## 治疗适应症

广泛用于克罗恩病或溃疡性结肠炎患儿。

加拿大卫生部批准适应症：

儿科：

- 克罗恩病和溃疡性结肠炎

成人：

- 克罗恩病和溃疡性结肠炎



## 药物作用机理

英夫利昔单抗通过阻断一种名为肿瘤坏死因子 $\alpha$  (TNF $\alpha$ ) 的细胞因子来发挥功效。该因子由免疫系统产生，可引发炎症反应。



## 给药途径

- 本药品通过静脉注射给药。

- 患者首先在第0、2和6周接受输液。

- 之后，每4-8周需要一次静脉注射。有时候药品剂量需重新加载，或需要缩短给药间隔时间。

- 部分患者在使用本药后能快速见效，但有些患者可能需要更长时间才有效果。请坚持用药。



## 使用方法

患者将在医院或输液中心接受静脉注射。

## 疫苗使用

活疫苗

- 不安全（用药期间不建议用）



灭活疫苗

- 安全（可以用）



## 用药时间

本药物用于控制患者的炎症性肠病 (IBD)，并维持病情长期稳定。英夫利昔单抗可与其他药物联合使用。



## 治疗前特殊检查

筛查包括结核病在内的感染性疾病，以及对多种病毒免疫力的检测。



## 用药期监控

为评估药效和副作用，患者将定期进行血液检测，粪便检测、内窥镜检查和其他影像学检查。

定期监测血液中英夫利昔单抗浓度，可确保药物剂量足够但又不过量。



## 药物副作用

- 输液相关反应，如呼吸急促、发热、皮疹、血压或心率变化。通常可以使用药物来治疗和/或预防这些副作用。

- 本药物影响免疫系统，可能增加感染的风险，极少数情况下可能导致癌症。

- 头痛

- 皮肤皮疹（银屑病/湿疹）



## 何时需要联络医生

请在以下情况时致电医生：

- 想停药或已停药

对任何副作用有疑虑

其他需要联系医生的情况：

- 发热或怀疑有感染

- 怀孕