Scanner pour en savoir plus

CIDsCaNN
Canadian Children Inflammatory Bowel Disease Network

Budesonide (Rectal)

Lavement d'ENTOCORT®

Dans quel cas ce médicament est utilisé ?

Il est largement utilisé pour les enfants atteints de colite ulcéreuse et parfois dans la maladie de Crohn.

Health Canada

Santé Canada a également approuvé le Budésonide chez l'adulte atteint de colite ulcéreuse.

Comment ce médicament agit-il ?

Le Budésonide agit en diminuant l'inflammation locale de différentes manières. Il est très similaire à une hormone naturelle de l'organisme, le cortisol.

Comment utiliser ce médicament ?

Le Budésonide se présente sous la forme d'un flacon de liquide et d'une plaquette de comprimés. Un comprimé doit être entièrement dissous dans un flacon avant d'être utilisé. Les comprimés ne doivent pas être pris par la bouche.

Utilisez ce médicament le soir avant de vous coucher. Les doses rectales doivent être maintenues pendant au moins 30 minutes, mais cela peut prendre du temps et de la pratique avant d'y parvenir. Si possible, gardez la dose toute la nuit.

Bien que certaines personnes soient soulagées rapidement, cela peut prendre un peu plus de temps pour d'autres. Continuez à prendre vos médicaments.

Lieu d'administration du traitement

PHARMACY

Médicament sur ordonnance, à récupérer en pharmacie.

Combien de temps faut-il utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour contrôler votre maladie inflammatoire de l'intestin. Il ne sera pas utilisé pour la maintenir sous contrôle à long terme. Il pourra être repris en cas de besoin et en cas de poussée de votre maladie inflammatoire de l'intestin.

Surveillance pendant le traitement

Des analyses de sang régulières, des tests de selles, une endoscopie et/ou d'autres examens d'imagerie seront effectués pour surveiller la réponse et les effets secondaires traitement.

Effets secondaires

Lorsqu'il est pris conformément à la prescription et pendant de courtes périodes, le Budésonide n'entraîne que peu ou pas d'effets secondaires.

Des diarrhées, des flatulences et des ballonnements peuvent survenir pendant la prise du Budésonide.

Quand appeler mon médecin

Appelez votre médecin si:

-Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament

-Si vous êtes préoccupé par de possible effets secondaires

-Aggravation des symptômes de votre maladie inflammatoire de l'intestin comme du sang dans les selles, de la diarrhée et/ou douleur abdominale

-Si vous êtes enceinte

Vaccins

✗ -Vaccins vivants : non sécuritaires

✓ -Vaccins inactivés : sécuritaires

Copyright 2024 CIDsCaNN (cidscann.ca)