


# Prednisone

Scanner pour en savoir plus



## Dans quel cas ce médicament est utilisé ?

Approuvé par Santé Canada, il est largement utilisé pour les enfants et adultes atteints de la maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse.



## Comment ce médicament agit-il ?

La prednisone agit en diminuant l'inflammation de différentes manières. Elle est très similaire à une hormone naturelle de l'organisme, le cortisol.



## Comment utiliser ce médicament

Disponible sous forme de comprimés et en solution liquide.

Les effets bénéfiques de ce médicament se font généralement sentir après 1 ou 2 jours, mais cela peut aussi prendre un peu plus de temps dans certains cas. Continuez à prendre votre médicament.

Après quelques jours, la dose sera progressivement diminuée, tous les 5 à 7 jours environ, avant d'être définitivement arrêtée.



## Lieu d'administration du traitement

Médicament sur ordonnance, à récupérer en pharmacie.



## Combien de temps faut-il utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour contrôler votre maladie inflammatoire de l'intestin. Il ne sera pas utilisé pour la maintenir sous contrôle à long terme. Il pourra être repris en cas de besoin et en cas de poussée de votre maladie inflammatoire de l'intestin.



## Surveillance pendant le traitement

Des analyses de sang régulières, des tests de selles, une endoscopie et/ou d'autres examens d'imagerie seront effectués pour surveiller la réponse et les effets secondaires traitement.



## Effets secondaires

- Brûlures d'estomac (à prendre au milieu d'un repas)
- Insomnie (à prendre le matin)
- Sauts d'humeur
- Augmentation de l'appétit
- Plus d'énergie que d'habitude
- Glycémie élevée
- Pression artérielle élevée
- Risque d'infection
- Prise de poids
- Acné
- Accélération de la croissance des poils du visage et du corps

La majorité de ces effets secondaires, y compris la prise de poids, sont réversibles à la diminution ou à l'arrêt de la prednisone.

Les effets secondaires suivants surviennent principalement chez les personnes qui prennent de la prednisone souvent et/ou pendant une longue période :

- Faible taux de cortisol dans le sang
- Troubles osseux et oculaires
- Ralentissement de la croissance chez les enfants
- Ralentissement de la cicatrisation des plaies



## Quand appeler mon médecin

Appelez votre médecin si :

- Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament
- Si vous êtes préoccupé par de possible effets secondaires
- Aggravation des symptômes de votre maladie inflammatoire de l'intestin comme du sang dans les selles, de la diarrhée et/ou douleur abdominale
- Si vous êtes enceinte



## Vaccins



Vaccins vivants :  
Non sécuritaires



Vaccins inactivés :  
Sécuritaires