


# Upadacitinib

RINVOQ®

Scanner pour en savoir plus



## Dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?

Il est actuellement étudié pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse chez les enfants.



Santé Canada a approuvé l'Upadacitinib pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse chez les adultes.



## Comment ce médicament agit-il ?

L'Upadacitinib agit en ciblant une partie spécifique du système immunitaire responsable de l'inflammation. Il appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de JAK.



## Test spéciaux effectués avant le début du traitement

Dépistage des infections, y compris la tuberculose, et évaluation de l'immunité à divers virus.



## Comment utiliser ce médicament ?

Disponible sous forme de comprimés, à prendre une fois par jour. Les comprimés doivent être avalés sous leur forme complète et ne doivent pas être coupés, mâchés, écrasés ou dissous.

Pendant le traitement, vous ne devez pas manger de pampleousse ni boire de jus de pampleousse.



## Lieu d'administration du traitement

Médicament sous ordonnance, à récupérer à votre pharmacie.



## Vaccins

 Vaccins vivants  
-Non sécuritaires  Vaccins inactivés  
-Sécuritaires



## Combien de temps doit-on utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour maîtriser la maladie inflammatoire de l'intestin et la maintenir sous contrôle à long terme.



## Surveillance pendant le traitement

Des analyses sanguines régulières, des analyses de selles, des endoscopies et/ou d'autres examens d'imageries seront effectués pour surveiller la réponse, ainsi que les effets secondaires du traitement.



## Effets secondaires

Faible taux de globules rouges, de globules blancs et/ou de plaquettes.

- Risque d'infection
- Inflammation du foie
- Cholestérol sanguin augmenté
- Acné

Les effets indésirables suivants se sont rarement produits chez les adultes :

- Thrombose (caillots sanguins)
- Évènements cardiovasculaires majeurs (accident vasculaire cérébral, crise cardiaque)
- Certaines formes de cancer



## Quand faut-il appeler le médecin ?

Appelez si :

- Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament
- Si vous êtes inquiets par de possibles effets secondaires
- Aggravation des symptômes de votre MII comme du sang dans les selles, des diarrhées et/ou une douleur abdominale
- Si vous êtes enceinte