

ميثوتريكسات (دواء عن طريق الفم)



ما هي استعمالات هذا الدواء؟

يستخدم هذا الدواء لعلاج الأطفال المصابين بداء كرون أو التهاب القولون القرصي.

يستخدم ميثوتريكسات عادةً مع أدوية أخرى لإلتهاب الأمعاء لتحسين فعاليتها (تحديداً إنفليكسيماب أو أداليموماب) أو كدواء إضافي لتقليل تكوين مُضادّات ضد الأدوية (إنفليكسيماب أو أداليموماب) ممّا يساهم في تحسين نسبة هذه الأدوية و الإستجابة لها.



كيف يعمل هذا الدواء؟

يعمل ميثوتريكسات على تخفيف الالتهاب بتقليص نشاط الجهاز المناعي.



كيف يُستخدم هذا الدواء؟

مُتاح في شكل أقراص فمويّة

يتم تناول جرعة مخفّضة أسبوعيّاً

يجب إضافة حمض الفوليك (فيتامين ب9)

لا يجب استخدام ميثوتريكسات تزامناً مع المضادّات الحيوية مثل تريموكسازول و تريميثوبريم (سبترا) عليك دائماً استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل البدء في استخدام دواء جديد.



أين يتم أخذ الدواء؟

إضرب وصفتك الطّبية من صيدليّتك

التطعيمات؟



ليس من الآمن الحصول على لقاحات حيّة أثناء استخدام أداليموماب.



استخدام اللقاحات المعطلّة آمن



ما هي مدة استخدام هذا الدواء؟

يستخدم ميثوتريكسات للسيطرة على داء التهاب الأمعاء على المدى الطويل يمكن استخدام أدوية أخرى تزامناً مع ميثوتريكسات

ما هي الفحوصات التي يجب القيام بها قبل البدء باستخدامه؟



يجب التّأكد من خلوك من داء السل والتّنبّه من مناعتك ضدّ الفيروسات.



ما هي الفحوصات التي يجب القيام بها أثناء استخدامه؟

ستحتاج إلى فحوصات دم دورية، تحليل البراز، تنظير القولون وفحوصات أشعة للتأكد من استجابتك للدواء وخلوك من أية أعراض جانبية



ما هي الأعراض الجانبية؟

الغثيان، فقدان الشهية، الإحساس بالتعب لمدة 24 أو 48 ساعة بعد الجرعة

الصداع و التهيج

إلتهاب الكبد أو الإلتهاب الرئوي

تساقط الشّعر

الأدوية المنبّطة للمناعة قد تتسبب في حدوث عدوى او نادرا امراض خبيثة



متى أتصل بالطبيب؟

من فضلك اتّصل بالطبيب إذا كنت تريد أو استدعت حالتك التوقف عن استخدام الدواء

كانت لديك مخاوف بخصوص الأعراض الجانبية

أسباب أخرى تستدعي الاتصال بالطبيب الحمى أو العدوى- الحمل-