

# 5-ASA or Mesalamine (Rectal)

MEZERA® foam or suppositories, PENTASA® enema or suppositories,  
SALOFALK® enema or suppositories



## Dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?

Il est utilisé de façon fréquente chez les enfants avec une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse.



Health Canada Santé Canada a également approuvé les 5-ASA pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse chez les adultes.



## Comment ce médicament agit-il ?

Les 5-ASA agissent localement afin de réduire l'inflammation dans les intestins.

Il y a plusieurs médicaments 5-ASA qui diffèrent selon leur voie d'administration et leur enrobage.



## Comment utiliser ce médicament ?

Utilisez ce médicament le soir avant de vous coucher. Les doses rectales doivent être maintenues pendant au moins 30 minutes, mais cela peut prendre du temps et de la pratique avant d'y parvenir. Si possible, gardez la dose toute la nuit.

Bien que certaines personnes soient soulagées rapidement, cela peut prendre un peu plus de temps pour d'autres. Continuez à prendre votre médication.



## Lieu d'administration du traitement

Médicament sous ordonnance, à récupérer à votre pharmacie.




## Vaccins

✓ Vaccins vivants  
-Sécuritaires

✓ Vaccins inactivés  
Sécuritaires

Scanner pour en savoir plus



## Combien de temps doit-on utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour maîtriser la maladie inflammatoire de l'intestin et la maintenir sous contrôle à long terme.



## Surveillance pendant le traitement

Des analyses sanguines régulières, des analyses de selles, des endoscopies et/ou d'autres examens d'imageries seront effectués pour surveiller la réponse, ainsi que les effets secondaires du traitement.



## Effets secondaires

Une douleur abdominale, des diarrhées, nausées ou céphalées peuvent arriver.

Une inflammation du pancréas, des poumons, du foie, des reins et du cœur peut rarement arriver.



## Quand faut-il appeler le médecin ?

Appelez si :

-Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament

-Si vous êtes inquiets par de possibles effets secondaires

-Aggravation des symptômes de votre MII comme du sang dans les selles, des diarrhées et/ou une douleur abdominale

-Si vous êtes enceinte