


Ustekinumab

Scanner pour en savoir plus



STELARA®, JAMTEKI®*, WEZLANA®*, FINLIUS®*, STEQEYMA®*

*biosimilars



Dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?

Approuvé par Santé Canada, il est utilisé de façon fréquente chez les enfants avec une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse.



Health Canada Santé Canada a également approuvé l'ustekinumab pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse chez les adultes.



Comment ce médicament agit-il ?

L'ustekinumab agit en bloquant l'action de certaines cytokines (IL-12 et IL-23). Ces cytokines sont produites par le système immunitaire et sont impliquées dans la cascade inflammatoire.



Comment utiliser ce médicament ?

La dose #1 doit être donnée par intraveineuse sur au moins une heure.

-Les doses suivantes peuvent être données par voie intraveineuse toutes les 4 à 8 semaines. Souvent, les individus peuvent avoir besoin d'une réinduction par intraveineuse ou une diminution de l'intervalle entre les doses.

-Bien que certaines personnes obtiennent un bénéfice assez rapidement cela peut prendre un peu plus de temps chez d'autres. Il est important de continuer à prendre ce médicament.



Lieu d'administration du traitement

Les doses par voie intraveineuses seront administrées à l'hôpital ou dans un centre de perfusion.

Les doses sous-cutanées peuvent être administrées à la maison.



Tests spécifiques effectués avant le début du traitement

Test de dépistage des infections incluant la tuberculose et évaluation de l'immunité à divers virus.



Combien de temps doit-on utiliser ce médicament ?

Ce médicament sera utilisé pour maîtriser la maladie inflammatoire de l'intestin et la maintenir sous contrôle à long terme.



Surveillance pendant le traitement

Des analyses sanguines régulières seront effectuées pour surveiller la réponse, ainsi que les effets secondaires du traitement. La fréquence des analyses sanguines sera déterminée par l'équipe traitante.

La quantité d'ustekinumab dans votre sang peut être mesurée pour s'assurer que votre dose de médication est adéquate.



Effets secondaires

Des réactions au site d'injection tel que de l'érythème, de la douleur et du prurit. Mentionnez-le à votre médecin si ces symptômes sont sévères.

-Les médicaments qui affectent le système immunitaire peuvent aussi être associés à la survenue d'infections et très rarement de cancers.

-Étourdissements et céphalées



Quand faut-il appeler le médecin ?

Appelez si :

- Vous voulez arrêter ou avez déjà arrêté ce médicament
- Si vous êtes inquiets par de possibles effets secondaires

Autres raisons d'appeler le médecin :

- Si vous avez de la fièvre ou vous si vous pensez avoir une infection
- Si vous êtes enceinte
- Nausées, vomissements ou douleur abdominale
- Si vous développez des céphalées, des convulsions, de la confusion ou une vision trouble



Vaccins



Vaccins vivants
-Non sécuritaires



Vaccins inactivés
-Sécuritaires