

CORYZA CHEZ
LA POULE
COMMENT
UTILISER LE
TAMAMY?



SYMPTÔMES

- **Secoue la tête fréquemment**
- **Mousse dans les yeux**
- **Éternuement**

GRAVITÉ

FAIBLE

MODE D'EMPLOIS

- Donner 1 à 2ml de Tamamy directement dans le bec, 1x/jr
- Diluer 6ml de Tamamy dans 500ml d'eau et servir comme breuvage



SYMPTÔMES

- **Écoulement nasale claire**
- **Éternuement et/ou toux**
- **Léger gonflement d'un ou des yeux**
- **Légère apathie**
 - **Somnolence**
 - **Léger abattement**

GRAVITÉ

MOYEN

MODE D'EMPLOIS

- Donner 2ml de Tamamy directement dans le bec 2x/jr
- Diluer 6ml de Tamamy dans 500ml d'eau et servir comme breuvage
- Compresse chaudes et humides, ajouter 3-4 gouttes de Tamamy directement sur la compresse, appliquer pendant 5 à 10 minutes sur le ou les yeux gonflés, répéter minimum 2 fois par jour



SYMPTÔMES

- **Éternuement, toux, râlement**
- **Écoulement nasale, formation de croûte de mucus sur les rebords des narines**
- **Écoulement des yeux (clair ou jaunâtre à verdâtre)**
- **Yeux très enflés/gonflés**
- **Yeux collés par les écoulements**
- **Comportement apathique**
 - **Somnolence**
 - **Abattue**
 - **Perte de l'appétit**

GRAVITÉ

SÉVÈRE

MODE D'EMPLOIS

- Donner 2ml de Tamamy directement dans le bec, 3x/jr
- Diluer 6ml de Tamamy dans 500ml d'eau et servir comme breuvage
- Compresse chaudes et humides, ajouter 3-4 gouttes de Tamamy directement sur la compresse, appliquer pendant 10 minutes sur le ou les yeux gonflés, répéter 3 à 4 fois par jour
- Bain facial, pendant l'application de la compresse;
 - Mettre 4 litres d'eau chaude mais non bouillante dans un bol (chaleur tolérable pour ne pas brûler la peau du visage de la poule)
 - Ajouter 1 c. à table de Tamamy à l'eau chaude
 - Mettre la tête de la poule au-dessus du bol, soit pendant 10 minutes le temps de l'application de la compresse
- Après ces soins;
 - Nettoyer les yeux et le nez de la poule avec de l'eau stérile afin d'éliminer les croûtes de mucus



IMPORTANT : NE PAS METTRE LE TAMAMY PURE DANS LES YEUX.
NE PAS UTILISER EN MÊME TEMPS QU'UN AUTRE TRAITEMENT
ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIBIOTIQUE OU MÉDICAMENTEUX SANS
L'AVIS D'UN VÉTÉRINAIRE AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE
RÉACTIONS ALLERGIQUE OU TOUT AUTRE INCOMPATIBILITÉ.

Donner aux poussins seulement dans un abreuvoir de type tétine
Afin d'éviter que le produit enduise le duvet des poussins s'il y a
Un dégât d'eau avec un abreuvoir de type standard
La solution rendant le duvet inefficace au
réchauffement du poussin, cela étant causé par les
microfilms formant une laque sur le duvet.



IMPORTANT : NE PAS DIRECTEMENT CHAUFFER LE TAMAMY AFIN D'ÉVITER LA PERTE DES PROPRIÉTÉS DU PRODUIT. TOUJOURS L'ADDITIONNER À DE L'EAU PRÉALBLEMENT CHAUFFÉ.

DURÉ DE CONSERVATION :

- **1 SEMAINE AU RÉFRIGÉRATEUR**
- **6 MOIS AU CONGÉLATEUR**

NE PAS ADMINISTRER PENDANT PLUS DE 10 JOURS SIMULTANÉMENT. PRENDRE UNE PAUSE DE 10 JOURS ENTRE CHAQUE TRAITEMENT. AJUSTER LA DOSE AU BESOIN.