



INSTRUCCIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA

Por favor, revise y siga las siguientes indicaciones previas a su tratamiento con toxina botulínica. Estas restricciones están diseñadas para minimizar el riesgo de posibles complicaciones.

- **El paciente debe estar en buen estado de salud y no tener infecciones activas en la piel en el área de tratamiento.**
- **Evite consumir bebidas alcohólicas y con cafeína al menos 24 horas antes del tratamiento.** El alcohol puede diluir la sangre, lo cual incrementa el riesgo de hematomas.
- **Evite medicamentos antiinflamatorios y anticoagulantes idealmente durante un período de dos (2) semanas antes del tratamiento y unos días después del mismo.** Medicamentos y suplementos como Aspirina, Vitamina E, Ginkgo Biloba, Hierba de San Juan, Ibuprofeno, Motrin, Advil, Aleve, Vioxx y otros AINEs provocan adelgazamiento de la sangre y pueden aumentar el riesgo de hematomas o inflamación después de las inyecciones.
- **Programe su cita para la aplicación de toxina botulínica al menos entre 2 a 4 semanas antes de un evento especial** para evitar la posibilidad de presentar hematomas el día del evento.
- **Si es posible, acuda a su cita con el rostro limpio y recién lavado.**