

Tardive Dyskinesia (TD)

is a movement condition that can happen after long-term use of certain psychiatric medicines. It causes uncontrollable movements of the face, tongue, or other parts of the body. Two FDA-approved medications can help manage TD symptoms: Austedo® and Ingrezza®.

Austedo® (deutetrabenazine)

- What it does: Helps reduce abnormal, involuntary movements by lowering certain brain chemicals (dopamine activity).
- How it's taken: Usually taken twice a day with food; dose is slowly increased based on response and tolerance.
- Benefits: Proven to reduce TD symptoms; may also help with Huntington's chorea.
- Possible side effects: Sleepiness, fatigue, depression, restlessness, stiffness, or changes in heart rhythm.
- Important to know: Don't stop suddenly. Tell your doctor if you have depression, heart problems, or liver disease.

Ingrezza® (valbenazine)

- What it does: Works by balancing dopamine activity in the brain to calm involuntary movements.
- How it's taken: Usually once a day, with or without food.
- Benefits: Effective and convenient once-daily dosing; generally well tolerated.
- Possible side effects: Sleepiness, fatigue, dry mouth, balance or walking issues, or heart rhythm changes.
- Important to know: Don't drive until you know how it affects you. Inform your provider about all your medications.

- Talk with your doctor about which option may be best for you. The right choice depends on your health, other medications, and preferences.
- If you notice mood changes, worsening movements, or side effects, contact your healthcare provider right away.



For more information:
www.austedo.com
www.ingrezza.com



Discinesia Tardía (DT)

La discinesia tardía (DT) es un trastorno del movimiento que puede aparecer después del uso prolongado de ciertos medicamentos psiquiátricos. Provoca movimientos involuntarios de la cara, la lengua u otras partes del cuerpo. Existen dos medicamentos aprobados por la FDA que pueden ayudar a controlar los síntomas de la DT: Austedo® y Ingrezza®.

Austedo® (deutetrabenazine)

- Qué hace: Ayuda a reducir los movimientos anormales e involuntarios al disminuir ciertos químicos cerebrales (actividad de dopamina).
- Cómo se toma: Generalmente dos veces al día con comida. La dosis se aumenta poco a poco según la respuesta y tolerancia.
- Beneficios: Demostrado en estudios clínicos para reducir los síntomas de la DT. También puede usarse en la corea de Huntington.
- Posibles efectos secundarios: Somnolencia, fatiga, depresión, inquietud, rigidez o cambios en el ritmo cardíaco.
- Importante saber: No suspenda el medicamento de forma repentina. Informe a su médico si tiene depresión, problemas cardíacos o hepáticos.

Ingrezza® (valbenazine)

- Qué hace: Equilibra la actividad de la dopamina en el cerebro para calmar los movimientos involuntarios.
- Cómo se toma: Generalmente una vez al día, con o sin comida.
- Beneficios: Eficaz en la reducción de los movimientos de DT; dosis conveniente una vez al día.
- Posibles efectos secundarios: Somnolencia, fatiga, boca seca, problemas de equilibrio o de caminar, o alteraciones del ritmo cardíaco.
- Importante saber: No conduzca ni maneje maquinaria hasta saber cómo le afecta. Informe a su médico sobre todos sus medicamentos.

- Hable con su médico sobre cuál opción puede ser la mejor para usted. La elección depende de su salud general, otros medicamentos y sus preferencias.
- Si nota cambios de ánimo, empeoramiento de los movimientos o efectos secundarios, contacte a su médico de inmediato.



Para más información:
www.austedo.com
www.ingrezza.com

