ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ ALLOJENİK RIC (Busulfan- Fludarabine -ATG) PROTOKOLÜ - 2 *(Eur J Haematol. 2013 Mar;90(3):177-86)*

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

Ad-Soyadı: Tanı: **Boy:** **Kilo:** **VYA:**

İlaç uygulamaları (D-8 ile D+12. Günler)

Günler	Tarih	Antineoplastikler: Busulfan Günde 4 kez 0,8 mg/kg (3.2 mg / kg /gün) "Doz hesaplaması ideal vücut ağırlığına göre yapılır."	Fludarabine 30 mg/kg /gün	Rabbit ATG 2.5 mg /kg /gün	Antimikrobiyal profilaksi: Valasiklovir 1 x 500 mg/gün	Flukonazol 1 x 400 mg/gün	Moksifloksasin 1 x 400 mg/gün	TMP/SMZ 2X1 fort tb.	Metronidazol 3x500 mg tb./gün	GVHD profilaksi: Siklosporin (iv) 2 x1.5 mg/k/gün	Metotreksat	Diğer ilaçlar: G-CSF 5 µg/kg	Ürikoliz tb 1x1	Epanutin IV	IVIG 100 mg/kg	Ursofalk 3 x 250 mg tb	ATEŞ C°	Günler
D-7					+	+	+		+	D+31 veya PO alıma kadar IV, sonra PO geçilir ve 2 x3 mg/kg/gün dozunda +180. güne uygulanır	GVHD profilaksisi için 4 gün uygulanır. (D+1, D+3 D+6 ve D+11. günlerde) IV olarak uygulanır.		+			+		D-7
D-6			+		+	+	+	+ +	+				+			+		D-6
D-5			+		+	+	+		+				+			+		D-5
D-4			+		+	+	+		+				+	+		+		D-4
D-3		+ + + +	+		+	+	+		+				+	+		+		D-3
D-2		+ + + +	+	+	+	+	+	+ +	+				+	+		+		D-2
D-1				+	+	+	+	Engrafman sonrası tekrar başlanarak posttransplant 1. yılda kesilir.	+	+ +			+	+		+		D-1
D 0		**KÖK HÜCRE İNFÜZYONU**			+	+	+		+	+ +			+	+		+		**D 0**
D+1					+	+	+		+	+ +	15 mg/m²		+	+		+		D+1
D+2					+	+	+		+	+ +				+		+		D+2
D+3		**Parenteral antibiyotikler**			+	+	+		+	+ +	10 mg/m²					+		D+3
D+4					+	+	+		+	+ +						+		D+4
D+5					+	+	+		+	+ +		+				+		D+5
D+6					+	+	+		+	+ +	10 mg/m²	+				+		D+6
D+7					+	+	+		+	+ +		+			+	+		D+7
D+8					+	+	+		+	+ +		+				+		D+8
D+9					+	+	+		+	+ +		+				+		D+9
D+10					+	+	+		+	+ +		+				+		D+10
D+11					+	+	+		+	+ +	10 mg/m²	+				+		D+11
D+12					+	+	+		+	+ +		+				+		D+12

← D +100 kadar devam edilir →

←D +100 kadar devam edilir →

←D +100 kadar devam edilir→

←D +30 kadar devam edilir→