

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ BU-CY (BUSULFAN-SİKLOFOSFAMİD) ALLOGENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ PROTOKOLÜ

Ad-Soyadı:		Tanı:		Boy:		Kilo:		VYA:			
Günler	Tarih	İlaç uygulamaları (D+13 ile D+33. Günler)									
		Parenteral antibiyotikler		Transfüzyonlar		Antimikrobial profilaksi					
		Eritrosit süsp.	Trombosit süsp	TDP							
D+13											
D+14											
D+15											
D+16											
D+17											
D+18											
D+19											
D+20											
D+21											
D+22											
D+23											
D+24											
D+25											
D+26											
D+27											
D+28											
D+29											
D+30											
D+31											
D+32											
D+33											

İlaç uygulamaları (D+13 ile D+33. Günler)

← D+100 kadar devam edilir →
 Eritrosit süsp.
 Trombosit süsp
 TDP
 Valasiklovir
 1 x 500 mg/gün
 Flukonazol
 1 x 400 mg/gün
 Moksifloksasin
 1 x 400 mg/gün
 TMP/SMZ
 2X1 fort.tb.
 Engraftman sonrası tekrar başlanarak posttransplant 1. yilda kesilir.
 Metronidazol
 3x500mgtb./gün
 Siklosporin
 2 x 1.5 mg/kg/gün
 D+31 veya PO alıma kadar
 IV, sonra PO geçilir ve 2 x 3 mg/kg/gün dozunda +180. Güne uygulanır.
 → D+30 kadar devam edilir →

Günler	ATEŞ C°	Günler
D+13	+	+
D+14	+	+
D+15	+	+
D+16	+	+
D+17	+	+
D+18	+	+
D+19	+	+
D+20	+	+
D+21	+	+
D+22	+	+
D+23	+	+
D+24	+	+
D+25	+	+
D+26	+	+
D+27	+	+
D+28	+	+
D+29	+	+
D+30	+	+
D+31	+	+
D+32	+	+
D+33	+	+