

Ad-SOYAD:	Tanı: APLASTİK ANEMİ (Severe)
Yaş /Cinsiyet:	Tedavi: ATG + Siklosporin
Tanı tarihi:	Tedaviye başlama tarihi:

Vücut yüzeyi:.....m² (boy:.....cm, ağırlık:.....kg)

Tedavi günleri	TARİH	Rabbit ATG 3.5 mg / kg (...mg / gün)	Siklosporin (10 mg/kg/gün)		Prednison 1 mg / kg / gün	Antibiyotik	Transfüzyon			ATEŞ C ⁰
							Eritrosit	Trombosit	TD P	
1		+	+	+	+					
2		+	+	+	+					
3		+	+	+	+					
4		+	+	+	+					
5		+	+	+	+					
6			+	+	+					
7			+	+	+					
8			+	+	+					
9			+	+	+					
10			+	+	+					
11			+	+	+					
12			+	+	+					
13			+	+	+					
14			+	+	+					
15			+	+	+					
16			+	+	+					
17			+	+	+					
18			+	+	+					
19			+	+	+					
20			+	+	+					
21			+	+	+					
22			+	+						
23			+	+						
24			+	+						

Anit hy m oc yt e gl ob uli n + cy cl os po ri ne

Az alt 1la ra k ke sil ec ek

25			+	+															
26			+	+															
27			+	+															
28			+	+															
29			+	+															
30			+	+															

***Anti timosit Globulin (ATG):** İnfüzyona başlamadan 5 mcg /0.1 mL intradermal test yapılacak. Test negatif ise 500 mL SF ya da % 5 dekstroz içerisine konulan ATG, 50 mL /saat gidecek şekilde infüzyona başlanacak. 30 dakika sonra eğer herhangi reaksiyon olmaz ise 6-8 saatte infüzyon tamamlanacak şekilde verilecek. (1.,2.,3. 4. ve 5.GÜNLER)

***Siklosporin:** Oral yol ile günde 2 kez verilecek, dozu yan etki (böbrek ve karaciğer fon bzk.) ve serum seviyesine göre (200- 400 ng/mL) ayarlanacak (10 mg/kg/ gün). (+180 günden sonra azaltılacak)

***Prednisolon:** İlk 14 gün süre ile oral 1 mg/kg verilecek. 14. günden sonra azaltılarak 28. günde sonlandırılacak.