

Ad-Soyadı:	Tanı:
Yaş /Cins:	Tedavi:
Tanı tarihi:	Önceki tedaviler:

Vücut yüzeyi:.....m² Boy:.....cm. Ağırlık:....kg.

MOBİLİZASYON REJİMİ İLAÇ UYGULAMALARI

Tedavi Günler	Tarih	İLAÇLAR			Antibiyotik		Transfüzyon			Kilo takibi	ATEŞ C°
		Siklofosfamid 4 g/m ² /gün	Mesna 5 x 1 g/m ² (5 doz /gün)	G-CSF 1x10 µg/kg/ gün			Eritrosit süsp.	Trombosit süsp.	TDP		
1		+	+ + +								
2			+ +								
3											
4											
5				+							
6				+							
7				+							
8				+							
9				+							
10				+							
11				+							
12				±							
13				±							
14				±							
15				±							
16				±							
17				±							
18				±							
19				±							
20				±							
21				±							

Siklofosfamid: Toplamg/gün siklofosfamid 1000 ml SF içerisinde 2-3 saatte verilecek.

Mesna (Uromitexan): Toplamg/gün. Toplam Uromitexan dozu 5'e bölünerek verilecek.

Uromitexan her uygulamada 100 ml SF içerisinde 10-15 dakikada verilecek.

Uromitexan'ın uygulama şekli:

1. **Doz:** Siklofosfamid infüzyonundan hemen önce
2. **Doz:** Siklofosfamid infüzyon bitiminden 1 saat sonra
3. **Doz:** Siklofosfamid infüzyon bitiminden 4 saat sonra
4. **Doz:** Siklofosfamid infüzyon bitiminden 8 saat sonra
5. **Doz:** Siklofosfamid infüzyon bitiminden 11 saat sonra

G-CSF: 12 saat ara ile SC olarak 2x5 µg/kg/ gün (D+5 → → WBC ≥10x10⁹/L, aferezin son günü)