

Ad-Soyadı:ZEYNEP ÖNER	Tanı: MULTİPLE MYELOM
Yaş /Cins: BAYAN	Tedavi: Mobilizasyon REJİMİ
Tanı tarihi:	Önceki tedaviler:
Vücut yüzeyi:1,77m ² Boy:160cm. Ağırlık:74kg.	

MOBİLİZASYON REJİMİ İLAÇ UYGULAMALARI

Tedavi Günler	Tarih	İLAÇLAR			Antibiyotik		Transfüzyon			Kilo takibi	ATEŞ C°
		Siklofosfamid 4 gr/m ² /gün	Mesna 5 x 1 gr/m ² (5 doz /gün)	G-CSF 1X10 µg/kg/ gün			Eritrosit süsp.	Trombosit süsp.	TDP		
1		+	+ + +								
2			+ +								
3											
4											
5				+							
6				+							
7				+							
8				+							
9				+							
10				+							
11				+							
12				±							
13				±							
14				±							
15				±							
16				±							
17				±							
18				±							
19				±							
20				±							
21				±							

Siklofosfamid: Toplam5,3.....gr/gün siklofosfamid 1000 ml SF içerisinde 2-3 saatte verilecek.

Mesna (Uromitexan): Toplam7,5...gr/gün. Toplam Uromitexan dozu 5'e bölünerek verilecek.

Uromitexan her uygulamada 100 ml SF içerisinde 10-15 dakikada verilecek.

Uromitexan'ın uygulama şekli:

- Doz:** Siklofosfamid infüzyonundan hemen önce 1gr
- Doz:** Siklofosfamid infüzyon bitiminden 1 saat sonra 1gr
- Doz:** Siklofosfamid infüzyon bitiminden 4 saat sonra 1gr
- Doz:** Siklofosfamid infüzyon bitiminden 8 saat sonra 1gr
- Doz:** Siklofosfamid infüzyon bitiminden 11 saat sonra 1gr

G-CSF: 12 saat ara ile SC olarak 2x5 µg/kg/ gün (D+5 → → WBC ≥10x10⁹/L, aferezin son günü)