

**ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ**

Hasta Adı-Soyadı: Tarih:

Boy: Kilo: Vücut yüzey alanı: İdeal vücut ağırlığı:

D-8: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex** 500 mg tb 1x1
- **Flukanazol** 200 mg kap 2x1
- **Avelox** 400 mg tb 1x1
- **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
- **Urikoliz 300 mg tb:** 1 x 1
- 18.00: **Epanutin** : (10 mg/kg): Toplam ..... mg IV  
(ilaç tek başına 50 mg/dakika dozu aşmayacak şekilde perfüze edilir. Perfüzyon sıvılarına karıştırılmaz. Her perfüzyon bitiminde set 10 ml serum fizyolojik ile yıkanır)

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D-7: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
  - **Ürikoliz** 300 mg tb po 1x1
  - **Valtrex** 500 mg tb 1x1
  - **Avelox** 400 mg tb 1x1
  - **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
  - **Flukanazol** 200 mg kap 2x1
  - **Bactrim fort tb:** 2X1
  - **Epanutin tablet:** 3 x 100 mg
  - **Antiemetik IV:** .....
  - 08.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg ..... mg IV
  - 14.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg ..... mg IV
  - 20.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg.....mg IV
  - 02.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg .....mg IV
- (İlaç % 9 NaCl 150 ml Mediflex içinde 2 saatlik perfüzyon ile uygulanmalıdır)

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D-6: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
  - **Ürikoliz** 300 mg tb po 1x1
  - **Valtrex** 500 mg tb 1x1
  - **Avelox** 400 mg tb 1x1
  - **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
  - **Flukanazol** 200 mg kap 2x1
  - **Bactrim fort tb:** 2X1
  - **Epanutin tablet:** 3 x 100 mg
  - **Antiemetik IV:** .....
  - 08.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg ..... mg IV
  - 14.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg ..... mg IV
  - 20.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg.....mg IV
  - 02.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg .....mg IV
- (İlaç % 9 NaCl 150 ml Mediflex içinde 2 saatlik perfüzyon ile uygulanmalıdır)

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D-5: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün

- **Ürikoliz** 300 mg tb po 1x1
- **Valtrex** 500 mg tb 1x1
- **Avelox** 400 mg tb 1x1
- **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
- **Flukanazol** 200 mg kap 2x1
- **Bactrim fort tb:** 2X1
- **Epanutin tablet:** 3 x 100 mg

- **Antiemetik IV:** .....

- 08.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg, Toplam..... mg IV

- 14.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg, Toplam..... mg IV

- 20.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg, Toplam..... mg IV

- 02.00: **Busulfan** 0.8 mg/kg, Toplam..... mg IV

*“Busulfan % 0. 9 NaCl 150 ml Mediflex içinde 2 saatlik perfüzyon ile uygulanmalıdır.”*

- 10.00: **Etoposid** 400 mg/m<sup>2</sup>, Toplam..... mg IV

*“Etoposid %5 Destroz % 0.2 NaCl 1.000-2.000 ml içinde 4 saatlik perfüzyon ile uygulanmalıdır.”*

**ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ**

Hasta Adı-Soyadı:

D-4: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Ürikoliz 300 mg tb:** 1x1
- **Valtrex 500 mg tb:** 1x1
- **Avelox 400 mg tb:** 1x1
- **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Epanutin tablet:** 3 x 100 mg
- **Antiemetik IV:** .....
- **10.00: Etoposid 400 mg/m<sup>2</sup> , Toplam..... mg IV**

*“Etoposid 1.000-2.000 ml %5 Destroz % 0.2 NaCl içinde 4 saatlik perfüzyon ile uygulanmalıdır.”*

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D-3: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Ürikoliz** 300 mg tb po 1x1
- **Valtrex** 500 mg tb 1x1
- **Avelox** 400 mg tb 1x1
- **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
- **Flukanazol** 200 mg kap 2x1
- **Bactrim fort tb:** 2X1
- **Epanutin tablet:** 3 x 100 mg
- 08.30: Antihistaminik amp (**Avil, Systral vb.**) IV: 1x1  
**Mesna** 75 mg/kg/gün, Toplam..... mg IV  
(1000 ml % 9 NaCl içinde 24 saatlik perfüzyon yapılır)
- 09.00: **Endoxan:** 50 mg/kg/gün, Toplam ..... mg IV  
(500 ml % 5 Dx içinde 1/2 saatlik IV perfüzyon ile uygulanır)  
Uygulama öncesi EKG çek, günde 2 kez ağırlık, 4 saatte bir idrar çıkışı takibi yap  
4 saatte < 600 ml idrar çıkışı olursa ½ amp Lasix IV yap

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D-2: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Ürikoliz** 300 mg tb po 1x1
- **Valtrex** 500 mg tb 1x1
- **Avelox** 400 mg tb 1x1
- **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
- **Flukanazol** 200 mg kap 2x1
- 08.30: Antihistaminik amp (**Avil, Systral vb.**) IV: 1x1  
**Mesna** 75 mg/kg/gün, Toplam..... mg IV  
(1000 ml ‰ 9 NaCl içinde 24 saatlik perfüzyon yapılır)
- 09.00: **Endoxan:** 50 mg/kg/gün, Toplam ..... mg IV  
(500 ml % 5 Dx içinde 1/2 saatlik IV perfüzyon ile uygulanır)  
Uygulama öncesi EKG çek, günde 2 kez ağırlık, 4 saatte bir idrar çıkışı takibi yap  
4 saatte < 600 ml idrar çıkışı olursa ½ amp Lasix IV yap

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D-1: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Ürikoliz 300 mg tb:** 1x1
- **Valtrex 500 mg tb:** 1x1
- **Avelox 400 mg tb:** 1x1
- **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(İlaç 100 ml ‰ 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)



**ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ**

Hasta Adı-Soyadı:

D 0: Tarih:.....

*Not: Kök hücre infüzyonunun yapıldığı tüm günler D0 kabul edilir.*

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Ürikoliz 300 mg tb:** 1x1
- **Valtrex 500 mg tb:** 1x1
- **Avelox 400 mg tb:** 1x1
- **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(ilaç 100 ml % 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **Kök hücre infüzyonu:** (Son siklofosfamid uygulamasından en az 48 saat sonra yapılır)  
İnfüzyon hacmi, kaynağı, kök hücre sayısı (CD 34+ hücre veya çekirdekli hücre

sayısı) kaydedilir, bakteriyolojik örnek ayrılır. Kök hücre infüzyon protokolü doğrultusunda işlem yapılır.

“ABO/Rh uyumsuz nakiller için gerekli işlemler ilgili protokol doğrultusunda uygulanır

**Önemli not:**

**Kök hücre; ışınlanmaz, infüzyon pompası veya lökosit filtresi kullanılmaz!!**

Hemorajik sistit yoksa idrar sondasını çek.

**UYARI !!!:**

**Bu/Cy/E rejimin uygulaması ile ilgili detaylı bilgi ilgili “İLAÇ UYGULAMLARI” bölümünde bulunmaktadır. Order uygulamasına geçmeden önce İLAÇ UYGULAMLARI’ dikkatle okunmalı ve tüm protokol seyri anlaşılmalı olmalıdır.**

**ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ**

Hasta Adı-Soyadı:

D +1: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Ürikoliz 300 mg tb:** 1x1
- **Valtrex 500 mg tb:** 1x1
- **Avelox 400 mg tb:** 1x1
- **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Metotreksat 15 mg/m<sup>2</sup>:** Toplam ..... mg IV
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(ilaç 100 ml % 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D + 2: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1×1
- **Avelox 400 mg tb:** 1×1
- **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2×1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2×1
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(İlaç 100 ml ‰ 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D + 3: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1x1
- **Avelox 400 mg tb:** 1x1
- **Lorazepam 2.5 mg tb:** 2x1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Metotreksat 10 mg/m<sup>2</sup>:** Toplam..... mg IV
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(İlaç 100 ml ‰ 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D + 4: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1×1
- **Avelox 400 mg tb:** 1×1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(ilaç 100 ml % 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün

**ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ**

Hasta Adı-Soyadı:

D + 5 Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1×1
- **Avelox 400 mg tb:** 1×1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(ilaç 100 ml % 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün

**ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ**

Hasta Adı-Soyadı:

D + 6: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1×1
- **Avelox 400 mg tb:** 1×1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Metotreksat 10 mg/m<sup>2</sup>:** Toplam..... mg IV
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(ilaç 100 ml ‰ 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün

**ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ**

Hasta Adı-Soyadı:

D + 7: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1×1
- **Avelox 400 mg tb:** 1×1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(ilaç 100 ml % 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün



**ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ**

Hasta Adı-Soyadı:

D + 8 Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1×1
- **Avelox 400 mg tb:** 1×1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(ilaç 100 ml % 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün

**ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ**

Hasta Adı-Soyadı:

D + 9: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1×1
- **Avelox 400 mg tb:** 1×1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(ilaç 100 ml % 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün

**ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG  
KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ**

Hasta Adı-Soyadı:

D + 10: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1×1
- **Avelox 400 mg tb:** 1×1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(ilaç 100 ml % 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG

KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D + 11: Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1×1
- **Avelox 400 mg tb:** 1×1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Metotreksat 10 mg/m<sup>2</sup>:** Toplam..... mg IV
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(İlaç 100 ml % 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ (Bu/Cy/E) OTOLOG

KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİM ORDERİ

Hasta Adı-Soyadı:

D + 12 Tarih:.....

**ORDER**

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO<sub>3</sub> + 1 amp KCl):  
.....ml/saat, .....ml/gün
- **Valtrex 500 mg tb:** 1×1
- **Avelox 400 mg tb:** 1×1
- **Flukanazol 200 mg kap:** 2x1
- **Sandimmun 50 mg amp** 12 saat ara ile 1.5 mg/kg ..... mg IV  
(ilaç 100 ml ‰ 9 NaCl içinde 2 saat içinde perfüze edilir)
- **G-CSF (Neupogen, Leucostim) 10 µg/kg/gün:** Toplam..... µg/gün