

YÜKSEK DOZ MELPHALAN TEDAVİSİNDE GENEL UYGULAMALAR

Hastanın adı-soyadı:

Tanı:

Tarih:

Yüksek doz melphalan öncesi hidrasyon;

- 1000ml 0.9% NaCl + 20mmol KCl 6 saat, daha sonra
- 1000ml 0.9% NaCl + 20 mmol KCl 60 dakikada ver
- 30 dakika sonra Furosemide 20-40mg IV bolus.

Melphalan uygulamasından önce;

- Ondansetron 8 mg veya granisetron 3mg veya tropisetron 5 mg (IV)
- Deksamethazon 8 mg (IV)
- Lansoprazol 30 mg veya omeprazol 20 mg (PO)

Melphalan: İdrar çıkışı 500ml/saat olduğunda ver (eğer idrar çıkışı yetersizse furosemidi tekrarla,

Melphalan infüzyonundan 5 dakika önce başlayarak infüzyon

tamamlanana kadar ağızda buz gezdirilecek.

Yüksek doz melphalan sonrası hidrasyon;

- 1000ml 0.9% NaCl + 20mmol KCl 2 saatte
- 1000ml 0.9% NaCl + 20mmol KCl 2 saatte
- 1000ml 0.9% NaCl + 20mmol KCl 4 saatte
- 1000ml 0.9% NaCl + 20mmol KCl 6 saatte

•Hastaların sıvı yüklenmesinden kaçınılmalı, aldığı-çıkardığı sıvı düzeyine göre gerekirse furosemid yapılmalıdır.